

Os desafios da enfermagem na detecção da sepse e as intervenções para seu tratamento precoce

Nursing challenges in the detection of sepsis and interventions for its early treatment

Almeida, Ana Cecília de Jesus^a, Andrade, Laudiceia Inácio da Silva^a, Souza, Layssa Vieira^a, Silva, Kainan Douglas dos Santos^b, Pinho, Maria Carla Vieira^c

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Preceptor de Estágio do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

c. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

A palavra sepse deriva do grego *septikós* e significa a ruptura do tecido, resultando em uma desordem orgânica capaz de originar, mantê-la ou provocar doença. Todos os esforços devem ser feitos para diagnosticar a sepse em seus estágios iniciais, quando a intervenção tem maiores possibilidades de evitar o óbito. Neste contexto, o papel da equipe de enfermagem é primordial, já que estes profissionais estão presentes de maneira constante ao lado do paciente. Objetivo: Identificar os desafios da equipe de enfermagem na detecção da sepse e as intervenções para seu tratamento precoce. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2016 e 2021. Para seleção dos textos foi realizada uma busca *online* nas Base de Dados da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). Consideraram-se 09 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Para apresentação dos resultados sobre os desafios da equipe de enfermagem na detecção da sepse e as intervenções para seu tratamento precoce utilizou-se 03 categorias temáticas, sendo: Dificuldades e desafios no diagnóstico precoce da sepse; Conhecimento da equipe de enfermagem sobre o protocolo de sepse e; Associação de fatores demográficos e clínicos. Conclusão: Os desafios dos profissionais da enfermagem concentram-se nas suas dificuldades para a detecção dos sinais e sintomas da sepse, na escassez da capacitação e, na falta da implementação de um protocolo assistencial, fazendo-se necessário investimentos institucionais para a contínua qualificação e atualização dos profissionais e na disponibilidade de protocolo de sepse nas unidades de saúde. **PALAVRAS-CHAVE:** sepse, cuidados com a sepse, cuidados de enfermagem, detecção da sepse

ABSTRACT

The word sepsis derives from the Greek *septikós* and means tissue rupture, resulting in an organic disorder capable of originating, maintaining or provoking disease. Every effort should be made to diagnose sepsis in its early stages, when the intervention is most likely to prevent death. In this context, the role of the nursing team is paramount since these professionals are constantly present alongside the patient. Objective: To identify the challenges of the nursing team in the detection of sepsis and the interventions for its early treatment. Methodology: This is a descriptive literature review, built from materials published between 2016 and 2021. To select the texts, an online search was carried out in the VHL Database (Virtual Health Library). We considered 09 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: To present the results on the challenges of the nursing team in the detection of sepsis and the interventions for its early treatment, 03 thematic categories were used, namely: Difficulties and challenges in the early diagnosis of sepsis; Knowledge of the nursing team about the sepsis protocol and Association of demographic and clinical factors. Conclusion: The challenges of nursing professionals are concentrated in their difficulties in detecting the signs and symptoms of sepsis, in the scarcity of training and, in the lack of implementation of a care protocol, making institutional investments necessary for the continuous qualification and updating of professionals and the availability of sepsis protocol in health units.

KEYWORDS: sepsis, sepsis care, nursing care, sepsis detection

O papel da enfermagem para prevenir e minimizar danos de quedas em idosos no ambiente domiciliar

The role of nursing to prevent and minimize damage from falls in the elderly in the home environment

Silva, Ivone Soares David da^a, Araújo, Jaqueline Pessanha Gomes^a, Araújo, Tatiane de Jesus^a, Aguiar, Janaina Paulini^b, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

Fatores sociais, culturais e econômicos, associados ao comprometimento funcional decorrente do envelhecimento, podem interferir na ocorrência de quedas em idosos e no declínio da sua qualidade de vida. A enfermagem pode contribuir para modificar esse cenário. Objetivo: identificar o papel da enfermagem para prevenir e minimizar danos de quedas em idosos no ambiente domiciliar. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2017 e 2022. Para seleção dos textos foi realizada uma busca *online* nas Base de Dados da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). Consideraram-se 14 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Para a apresentação do papel da enfermagem para prevenir e minimizar danos de quedas em idosos no ambiente domiciliar utilizou-se 05 categorias temáticas, sendo: Reconhecer o panorama social, cultural e econômico das quedas em idosos; Identificar os fatores intrínsecos para quedas em idosos; Conhecer os fatores extrínsecos para quedas em idosos; Entender o impacto da queda de idosos em domicílio e; Compreender a atuação da enfermagem na prevenção de quedas de idosos em ambiente domiciliar. Conclusão: A queda em idosos é um grande problema para saúde pública no contexto atual, apresentando como consequências, hospitalizações, trauma e óbito. A atuação de enfermagem com ações de promoção e prevenção de agravos demonstrou-se benéficas para evitar quedas de idosos em domicílio. E, o papel do enfermeiro, como agente integrador de ações de promoção da saúde e prevenção de agravos é imprescindível para prevenção de quedas em idosos.

PALAVRAS-CHAVE: saúde do idoso, prevenção de quedas, cuidado de enfermagem, acidente por queda, ambiente domiciliar

ABSTRACT

Social, cultural, and economic factors associated with functional impairment resulting from aging can interfere with the occurrence of falls in the elderly and the decline in their quality of life. Nursing can contribute to modifying this scenario. Objective: To identify the role of nursing to prevent and minimize damage from falls in the elderly in the home environment. Methodology: This is a descriptive literature review, built from materials published between 2017 and 2022. To select the texts, an online search was carried out in the VHL Database (Virtual Health Library). We considered 14 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: For the presentation of the role of nursing to prevent and minimize damage from falls in the elderly in the home environment, 05 thematic categories were used, namely: Recognize the social, cultural and economic panorama of falls in the elderly; Identify intrinsic factors for falls in the elderly; Knowing the extrinsic factors for falls in the elderly; Understand the impact of elderly people falling at home and; To understand the role of nursing in the prevention of falls in the elderly in the home environment. Conclusion: The fall in the elderly is a major problem for public health in the current context, presenting as consequences, hospitalizations and death. The nursing performance with actions to promote and prevent injuries proved to be beneficial to prevent falls in the elderly at home. And, the role of the nurse, as an integrating agent of health promotion and disease prevention actions, is essential for the prevention of falls in the elderly.

KEYWORDS: elderly health, fall prevention, nursing care, accident by fall, home environment

Aspectos gerais do método canguru e sua relação com o aleitamento materno

General aspects of the kangaroo method and its relationship with breastfeeding

Silva, Juliana Alves da^a, Esmeraldo, Michele dos Santos^a, Ribeiro, Luana de Lima^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

A amamentação é uma prática milenar, reconhecida como a melhor forma de alimentar e oferecer proteção imunológica ao recém-nascido, bem como fortalecer e proporcionar o vínculo mãe e filho. Dentre os diversos estímulos e métodos que procuram estabelecer o fortalecimento dessa ação se tem o Método Canguru, amplamente utilizado no Brasil. Para o Ministério da Saúde o Método Canguru é uma política nacional de saúde que integra um conjunto de ações voltadas para a qualificação e humanização do cuidado ao recém-nascido (RN). A posição canguru consiste em manter o recém-nascido em contato pele a pele, na posição vertical junto ao peito dos pais ou outros familiares. Objetivo: Identificar os aspectos gerais do Método Canguru e sua relação com o aleitamento materno. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2016 e 2021. Para seleção dos textos foi realizada uma busca *online* nas Base de Dados da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). Consideraram-se 20 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Para apresentação dos resultados sobre os benefícios da amamentação através do método canguru utilizou-se 04 categorias temáticas, sendo: (1) Os benefícios do Método Canguru no aleitamento materno, (2) A percepção das mães sobre o Método Canguru, (3) A importância e os desafios da equipe de enfermagem no Método Canguru e; (4) As dificuldades na implementação do Método Canguru. Conclusão: A amamentação ainda é um tema que deve ser amplamente discutido e o método canguru vem sendo utilizado como uma estratégia de humanização e aproximação de mãe e filho, fortalecendo o vínculo afetivo.

PALAVRAS-CHAVE: amamentação, método canguru, recém-nascido, aleitamento materno exclusivo

ABSTRACT

Breastfeeding is an ancient practice, recognized as the best way to feed and offer immunological protection to the newborn, as well as to strengthen and provide the bond between mother and child. Among the various stimuli and methods that seek to strengthen this action is the Kangaroo Method, widely used in Brazil. For the Ministry of Health, the Kangaroo Method is a national health policy that integrates a set of actions aimed at the qualification and humanization of care for the newborn (NB). The kangaroo position consists of keeping the newborn in skin-to-skin contact, in an upright position next to the chest of the parents or other family members. Objective: To identify the general aspects of the Kangaroo Method and its relationship with breastfeeding. Methodology: This is a descriptive literature review, built from materials published between 2016 and 2021. To select the texts, an online search was carried out in the BVS Database (Virtual Health Library). We considered 20 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: To present the results on the benefits of breastfeeding through the kangaroo method, 04 thematic categories were used, as follows: (1) The benefits of the Kangaroo Method in breastfeeding, (2) The mothers' perception of the Kangaroo Method, (3) The importance and challenges of the nursing team in the Kangaroo Method and; (4) Difficulties in implementing the Kangaroo Method. Conclusion: Breastfeeding is still a topic that should be widely discussed, and the kangaroo method has been used as a strategy to humanize and bring mother and child closer, strengthening the affective bond.

KEYWORDS: breastfeeding, kangaroo method, newborn, exclusive breastfeeding

Vulnerabilidade a infecções sexualmente transmissíveis: atuação do enfermeiro no atendimento ao idoso

Vulnerability to sexually transmitted infections: nurses' role in caring for the elderly

Silva, Adriana Carmo^a, Oliveira, Aline Rodrigues^a, Moraes, Ana Beatriz Vicente^a, David, Rosana^b, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU
b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

O desejo e a sexualidade estão presentes no cotidiano dos idosos, portanto, se faz necessário políticas públicas destinadas à esta população, considerando a liberdade e autonomia de expressar seus desejos, incentivando o autocuidado, e atenção à saúde para a sexualidade e prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Objetivo: Identificar a atuação do enfermeiro e da equipe de enfermagem na atenção a população acima de 60 anos sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis e sexualidade. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de estudos publicados entre 2017 e 2022. Realizou-se uma busca *online* nas Base de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Consideraram-se 16 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Para a apresentação da atuação da enfermagem para promoção da saúde e prevenção das ISTs na senioridade utilizou-se 05 categorias temáticas, sendo: Aspectos sociais, culturais e econômicos do processo de envelhecimento; Vivência da sexualidade na terceira idade; Processo de envelhecimento e impactos na sexualidade; Atuação de enfermagem na prevenção e promoção da saúde em relação às ISTs; Atuação de enfermagem na prevenção e promoção da saúde em relação à sexualidade. Conclusão: O estudo demonstrou a necessidade de mudança da grade curricular do enfermeiro, uma vez que, desde sua formação enquanto acadêmico até sua atuação profissional encontra-se um hiato no que tange a temática deste estudo. A partir disso, pode-se observar que, de modo geral, que o idoso se mantém sexualmente ativo, necessitando de assistência específica para sua faixa etária.

PALAVRAS-CHAVE: sexualidade, relação sexual, vulnerabilidade, doenças sexualmente transmissíveis, saúde do idoso

ABSTRACT

Desire and sexuality are present in the daily lives of the elderly, therefore, public policies aimed at this population are necessary, considering the freedom and autonomy to express their desires, encouraging self-care, and health care for sexuality and prevention of Sexually Infections. Communicable (ISTs). Objective: To identify the role of nurses and nursing staff in caring for the population over 60 years of age on Sexually Transmitted Infections and sexuality. Methodology: This is a descriptive literature review, built from studies published between 2017 and 2022. An online search was carried out in the Virtual Health Library Database. We considered 16 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: 05 thematic categories were used for the presentation of the nursing performance for health promotion and prevention of STIs in seniority, namely: Social, cultural, and economic aspects of the aging process; Experience of sexuality in old age; Aging process and impacts on sexuality; Nursing performance in the prevention and promotion of health in relation to STIs; Nursing practice in the prevention and promotion of health in relation to sexuality. Conclusion: The study demonstrated the need to change the curriculum of nurses, since, from their training as an academic to their professional performance, there is a gap regarding the theme of this study. From this, it can be observed that, in general, the elderly remains sexually active, requiring specific assistance for their age group.

KEYWORDS: sexuality, sexual intercourse, vulnerability, sexually transmitted diseases, elderly health

Assistência de enfermagem no manejo da dor em fissura mamilar

Nursing care in the management of pain in nipple fissures

Almeida, Anderson Carvalho de^a, Castro, Francisca Meiriane da Silva^a, Silva, Tayres de Lima^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

A amamentação é uma prática natural que beneficia não apenas a saúde do bebê, mas também o bem-estar da nutriz, da sua família e da sociedade, devido às características nutricionais do leite materno e ao vínculo entre a mãe e o bebê, o que favorece o perfeito crescimento e desenvolvimento da criança, diminuindo a morbimortalidade infantil. Objetivo: Identificar a assistência de enfermagem no manejo da dor as nutrizes com fissuras mamilares. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2012 e 2022. Realizou-se uma busca *online* nas Base de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Consideraram-se 08 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Para apresentação dos resultados sobre assistência de enfermagem no manejo da dor as nutrizes com fissuras mamilares utilizaram-se 04 categorias temáticas, sendo: (1) Educação permanente e a interface no aleitamento materno exclusivo com o aconselhamento como estratégia de apoio; (2) Correção da técnica para a pega e sucção correta; (3) Combate ao mito do leite fraco/insuficiente, pouco incentivo dos profissionais de saúde para prática de aleitamento materno exclusivo, falta de conhecimento da mãe sobre a importância do aleitamento materno e; (4) Orientações corretas sobre a amamentação às nutrizes. Conclusão: O papel da Enfermagem frente à promoção, apoio ao aleitamento materno e combate aos fatores que interferem negativamente na amamentação, como as fissuras mamárias, é imprescindível para o monitoramento dessa prática, em especial para aquelas mães que se sentem inseguras, primigestas e de menor faixa etária.

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno, manejo da dor, enfermagem, fissura mamilar, desmame

ABSTRACT

Breastfeeding is a natural practice that benefits not only the health of the baby, but also the well-being of the nursing mother, her family and society, due to the nutritional characteristics of breast milk and the bond between mother and baby, which favors the perfect growth and development of the child, reducing infant morbidity and mortality. Objective: To identify nursing care in pain management for nursing mothers with cleft nipples. Methodology: This is a descriptive literature review, built from materials published between 2012 and 2022. An online search was carried out in the Virtual Health Library Database. We considered 08 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: To present the results on nursing care in pain management, nursing mothers with cleft nipples were used 04 thematic categories, as follows: (1) Continuing education and the interface in exclusive breastfeeding with counseling as a support strategy; (2) Correction of technique for the correct grip and suction; (3) Combating the myth of weak/insufficient milk, little encouragement from health professionals to practice exclusive breastfeeding, lack of knowledge on the part of the mother about the importance of breastfeeding and; (4) Correct guidelines on breastfeeding for nursing mothers. Conclusion: The role of Nursing in the promotion and support of breastfeeding and combating factors that negatively interfere with breastfeeding, such as breast fissures, is essential for monitoring this practice, especially for those mothers who feel insecure, primigravid and pregnant. lower age group.

KEYWORDS: breastfeeding, pain management, nursing, nipple fissure, weaning

Os cuidados de enfermagem na redução dos riscos de queda em pacientes internados

Nursing care in reducing the risk of falls in hospitalized patients

Oliveira, Aryane Bianca Medeiros de^a, Souza, Elvis Jhonata de Oliveira^a, Piola, Giovanna Bruna^a, Ricardo, Otniel Lima^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

A queda é um evento adverso que ocorre quando um indivíduo vai ao chão ou a algum plano mais baixo que sua postura. Pode acontecer por alterações fisiológicas, alterações patológicas, fatores psicológicos, efeitos colaterais de medicamentos, comportamento e atividade do indivíduo ou meio ambiente, e inclusive, no ambiente hospitalar, demandando vigilância constante dos profissionais da enfermagem. Objetivo: Identificar os cuidados de enfermagem na redução dos riscos de queda em pacientes internados. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2014 e 2021. Realizou-se uma busca *online* nas Base de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde e *site* direcionado para a produção e disseminação de informações e tecnologias em qualidade e segurança do paciente. Consideraram-se 07 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Evidenciou-se que os cuidados de enfermagem na redução dos riscos de queda em pacientes internados envolvem: Orientação aos familiares quanto ao risco de queda; Garantia do uso da pulseira de identificação para risco de queda; Disposição da campainha ao alcance das mãos do paciente; Promoção de cuidados e educação dos pacientes e profissionais para os cuidados após alta hospitalar. Conclusão: A atuação do enfermeiro junto a equipe interdisciplinar e a família do paciente é fundamental para redução do risco de queda e, conseqüentemente, do seu tempo de internação. Nota-se a necessidade de orientação e vigilância constantes da equipe de saúde, familiares e cuidadores para que a prevenção da queda tanto no ambiente hospitalar quanto em casa.

PALAVRAS-CHAVE: prevenção de queda idosos, quedas intra-hospitalares, risco de quedas, escalas de avaliação de risco para queda

ABSTRACT

A fall is an adverse event that occurs when an individual falls to the ground or to some level lower than their posture. It can happen due to physiological changes, pathological changes, psychological factors, medication side effects, behavior, and activity of the individual or the environment, and even in the hospital environment, demanding constant vigilance from nursing professionals. Objective: To identify nursing care to reduce the risk of falls in hospitalized patients. Methodology: This is a descriptive, bibliographic review research, built from materials published between 2014 and 2021. An online search was carried out in the Virtual Health Library Database and website directed to the production and dissemination of information and technologies in quality and patient safety. We considered 07 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: It was evidenced that nursing care to reduce the risk of falling in hospitalized patients involves Guidance to family members regarding the risk of falling; Guarantee of the use of the identification bracelet for the risk of falling; Arrangement of the bell within reach of the patient's hands; Promotion of care and education of patients and professionals for post-discharge care. Conclusion: The nurse's role with the interdisciplinary team and the patient's family is essential to reduce the risk of falls and, consequently, their length of stay. There is a need for constant guidance and surveillance of the health team, family members and caregivers so that the prevention of falls both in the hospital environment and at home.

KEYWORDS: elderly fall prevention, in-hospital falls, risk of falls, risk assessment scales for falls

Dificuldades da atuação do enfermeiro com população em situação de rua: Autocuidado, aderência e continuidade ao tratamento do HIV/AIDS

Difficulties of nurses' performance with the homeless population: Self-care, adherence, and continuity to HIV/AIDS treatment

Leme, Kaio Vinícius Andrade Dias^a, Assis, Thayssa Gama de^a, Ribeiro, Thiago Veiga^a, Santos, Thiago Leite dos^b, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

A AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), decorrente da infecção pelo HIV (Vírus Humano da Imunodeficiência) é a doença que mais acomete pessoas que vivem em situação de rua e, grande parcela dessa população tem dificuldades para realizar o tratamento. Assim, o enfermeiro deve atuar na adesão, autocuidado e tratamento do HIV pelos moradores de rua. Objetivo: Identificar as dificuldades que o enfermeiro encontra para atuar na adesão e no tratamento do HIV pelos moradores de área livre. Metodologia: Pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2012 e 2022. Realizou-se uma busca *online* nas Base de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde e SciELO (*Scientific Eletronic Library Online*). Consideraram-se 09 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Dentre as dificuldades que o enfermeiro encontra para atuar na adesão e no tratamento do HIV pelos moradores de área livre, destacam-se: acolher este paciente, sanar dúvidas, trabalhar com a não conscientização do tratamento e com a vulnerabilidade de uma população que não tem perspectiva de melhorias. Estas pessoas têm dificuldade de aceitação de sua condição, de realizar seu autocuidado, modificar seu olhar sobre a relação sexual desprotegida e com mais de um parceiro, ingerem álcool com o antirretroviral obtendo uma eficácia menor. Conclusão: A abordagem do enfermeiro ao paciente com HIV/AIDS, esclarecendo todas as dificuldades do portador dentro do seu cotidiano, tendo respeito, ética e valorizando a pessoa com seus conhecimentos e aptidão permite uma assistência de enfermagem mais efetiva e com menos desistência ao tratamento.

PALAVRAS-CHAVE: HIV/AIDS, adesão ao tratamento, enfermagem, população em situação de rua

ABSTRACT

AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome), resulting from HIV infection (Human Immunodeficiency Virus) is the disease that most affects homeless people, and a large portion of this population has difficulties in carrying out treatment. Thus, the nurse must act in the adherence, self-care, and treatment of HIV by the homeless. Objective: To identify the difficulties that nurses face in working on adherence and treatment of HIV by residents of open areas. Methodology: A descriptive, bibliographic review, built from materials published between 2012 and 2022. An online search was carried out on the Virtual Health Library Database and SciELO (Scientific Electronic Library Online). We considered 09 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: Among the difficulties that the nurse finds to act in the adhesion and in the treatment of HIV by the residents of free areas, the following stand out: welcoming this patient, solving doubts, working with the lack of awareness of the treatment and with the vulnerability of a population that has no prospect of improvement. These people have difficulty accepting their condition, performing self-care, changing their view of unprotected sexual intercourse and with more than one partner, ingesting alcohol with the antiretroviral drug, obtaining less efficacy. Conclusion: The nurse's approach to the patient with HIV/AIDS, clarifying all the difficulties of the carrier within their daily lives, having respect, ethics and valuing the person with their knowledge and aptitude allows for a more effective nursing care and with less withdrawal from treatment.

KEYWORDS: HIV/AIDS, adherence to treatment, nursing, homeless population

Tromboembolismo pulmonar (TEP) relacionado a COVID-19: Cuidados de enfermagem e desafios da assistência na pandemia

Pulmonary thromboembolism (TEP) related to COVID-19: Nursing care and challenges of care in the pandemic

Mirele, Bianca^a, Barroso, Mayara^a, França, Rodrigo Melo de^a, Alves, Tabata^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

Ao final do ano de 2019 iniciou-se um surto de casos de pneumonia na cidade de *Wuhan*, na China, que brevemente viriam a tomar proporção mundial, acarretando uma pandemia global. A causa seria uma nova degeneração de coronavírus. Com os estudos iniciaram-se as especulações sobre possíveis complicações que a doença acarretaria à pacientes acometidos pela COVID-19 e, neste contexto observou-se que um determinado perfil de pacientes desenvolveu tromboembolismo pulmonar (TEP), relacionado a doença. Objetivo: Identificar os cuidados de enfermagem ao paciente acometido pelo Tromboembolismo Pulmonar (TEP) em consequência da COVID-19 e os desafios da assistência na pandemia. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2017 e 2022. Para seleção foram utilizadas as bases de dados da Biblioteca Virtual da Saúde. Consideraram-se 4 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Para apresentação dos resultados os cuidados de enfermagem ao paciente acometido pelo Tromboembolismo Pulmonar (TEP) em consequência da COVID-19 e os desafios da assistência na pandemia utilizou-se 02 categorias temáticas, sendo: (1) Cuidados de Enfermagem à Pacientes que Desenvolveram Tromboembolismo Pulmonar (TEP) decorrente da COVID 19 e; (2) Os Impactos da Pandemia na Assistência de Enfermagem. Conclusão: Observamos que é um assunto recente que requer mais estudo e pesquisa sobre o tema, sugerimos que mesmo com a pandemia terminando, devemos desenvolver estratégias e aprofundar os estudos sobre o vírus e essa complicação, pois, entende-se que jamais deixará de existir.

PALAVRAS-CHAVE: COVID 19, tromboembolismo pulmonar, assistência de enfermagem

ABSTRACT

At the end of 2019, an outbreak of pneumonia cases began in the city of Wuhan, China, which would soon reach worldwide proportions, causing a global pandemic. The cause would be a new degeneration of coronavirus. With the studies, speculation began about possible complications that the disease would cause to patients affected by COVID-19, and, in this context, it was observed that a certain profile of patients developed pulmonary thromboembolism (PTE), related to the disease. Objective: To identify nursing care for patients affected by Pulmonary Thromboembolism (PTE) because of COVID-19 and the challenges of assistance in the pandemic. Methodology: This is a descriptive literature review, built from materials published between 2017 and 2022. For selection, the databases of the Virtual Health Library were used. We considered 4 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: To present the results, the nursing care for the patient affected by Pulmonary Thromboembolism (PTE) because of COVID-19 and the challenges of assistance in the pandemic, 02 thematic categories were used, namely: (1) Nursing Care for Patients who Developed Pulmonary Thromboembolism (PTE) due to COVID 19 and (2) The Impacts of the Pandemic on Nursing Care. Conclusion: We observed that it is a recent subject that requires more study and research on the subject, we suggest that even with the pandemic ending, we should develop strategies and deepen studies on the virus and this complication, as it is understood that it will never cease to exist.

KEYWORDS: COVID 19, pulmonary thromboembolism, nursing care

Cuidados de enfermagem a pacientes críticos em uso de drogas vasoativas

Nursing care for critically ill patients using vasoactive drugs

Nunes, Alicy dos Santos Damaceno^a, Campos, Amanda Aparecida^a, Gonçalves, Eliziane Viana^a, Oliveira, Luini Alessandra Chaves de^a, Souza, Vanessa Sena^a, Hirano, Gisele Saraiva Bispo^b, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

As unidades de terapia intensiva são unidades de internação de alta complexidade, servem para o acolhimento de pacientes em estado grave como descompensação de um ou mais sistemas. São considerados graves indivíduos que se encontram em uma falência de um ou mais órgãos e sistemas, que necessitam de monitoramento e tratamento intensivo, que precisam de ventilação mecânica prolongada, utilização de drogas vasoativas (DVAs), vigilância contínua e em alguns casos de substituição artificial de funções orgânica. Objetivo: Identificar por meio da revisão bibliográfica, quais os cuidados de enfermagem ao paciente em uso de DVAs em UTI Adulto. Metodologia: Pesquisa bibliográfica, descritiva, em que as bases de dados da Biblioteca Virtual da Saúde. Foram consideradas 12 publicações que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão para a pesquisa, identificou-se os cuidados de enfermagem a pacientes em uso de DVAs, sendo alguns cuidados específicos para cada fármaco e alguns gerais após administração no paciente, são eles: Observar aspecto da solução antes e durante a administração, administrar as drogas em bomba de infusão, atentar às variações dos sinais do paciente por meio da aferição e monitorização, controlar volume urinário, usar cateter venoso central, sendo assim necessário mais estudo sobre o tema. Conclusão: O estudo possibilitou conhecer os cuidados a pacientes críticos em uso de drogas vasoativas como predominância e conhecimento de administração monitorização hemodinâmica independente de cada situação, possibilitando ao enfermeiro conhecimento amplo das DVAs atribuindo para que se sinta seguro diante dos cuidados prestados.

PALAVRAS-CHAVE: assistência de enfermagem, agentes vasoativos, unidade de terapia intensiva, paciente crítico

ABSTRACT

Intensive care units are high-complexity inpatient units, serving to care for patients in serious condition as decompensation of one or more systems. Individuals with a failure of one or more organs and systems, who need intensive monitoring and treatment, who need prolonged mechanical ventilation, use of vasoactive drugs (VADs), continuous surveillance and, in some cases, artificial replacement are considered serious. of organic functions. Objective: To identify, through a literature review, which nursing care is provided to patients using VADs in an Adult ICU. Methodology: Bibliographic, descriptive research, in which the databases of the Virtual Health Library. Twelve publications that met the inclusion and exclusion criteria for the research were considered, nursing care was identified for patients using VADs, with some specific care for each drug and some general care after administration to the patient, they are: Observe aspect of the solution before and during administration, administer the drugs in an infusion pump, pay attention to variations in the patient's signals through measurement and monitoring, control urinary volume, use a central venous catheter, thus requiring further study on the subject. Conclusion: The study made it possible to know the care of critically ill patients using vasoactive drugs as predominance and knowledge of administration hemodynamic monitoring independent of each situation, allowing nurses to have a broad knowledge of VADs, attributing them to feel safe in the face of the care provided.

KEYWORDS: nursing care, vasoactive agents, intensive care unit, critical patient

Saúde mental dos profissionais de enfermagem frente à pandemia COVID-19

Mental health of nursing professionals facing the COVID-19 pandemic

Nogueira, Bruna Pereira^a, Leal, Darlon Ferreira^a, Souza, Stella Alves^a, Silva, Tatiane Siqueira Marques da^a, Andrade, Tatilene Neves^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

Em março de 2020, a COVID-19 foi reconhecida como uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), tornando-se uma importante emergência de Saúde Pública mundial. Devido à alta demanda nos serviços de saúde, os profissionais de enfermagem se depararam com o medo do desconhecido, o alto risco de infecção, a sobrecarga laboral, a falta de equipamentos de proteção individual e o risco de morte. Tais fatores desencadearam o adoecimento mental nesses trabalhadores. Objetivo: Identificar as repercussões da pandemia COVID-19 na saúde mental dos profissionais de enfermagem. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de 09 publicações, que atenderam a temática do estudo, em português, publicadas entre 2020 e 2022, nas bases de dados do *Google Acadêmico*, *SciELO (Scientific Electronic Library Online)* e na Base de Dados do Conselho Federal de Enfermagem. Resultados: Para apresentação dos resultados sobre as repercussões da pandemia COVID-19 na saúde mental dos profissionais de enfermagem utilizou-se 03 categorias temáticas, sendo: (1) Adoecimento mental frente à pandemia; (2) Impactos da pandemia COVID 19 na saúde mental dos profissionais de enfermagem e; (3) Métodos de combate e enfrentamento. Conclusão: Evidenciou-se que, durante a pandemia, os profissionais de enfermagem estiveram em sobrecarga emocional e laboral, causando ansiedade, estresse ocupacional, Síndrome de *Burnout*, fadiga, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático e sofrimento moral. Dessa forma, faz-se necessária a manutenção e criação de estratégias de prevenção a fim de proteger a saúde mental durante e após a pandemia.

PALAVRAS-CHAVE: enfermagem, profissionais da saúde, COVID-19, pandemia, saúde mental

ABSTRACT

In March 2020, COVID-19 was recognized as a pandemic by the World Health Organization (WHO), making it a major public health emergency worldwide. Due to the high demand in health services, nursing professionals are faced with the fear of the unknown, the high risk of infection, work overload, lack of personal protective equipment and the risk of death. Such factors triggered mental illness in these workers. Objective: To identify the repercussions of the COVID-19 pandemic on the mental health of nursing professionals. Methodology: This is a descriptive literature review, built from 09 publications, which met the study theme, in Portuguese, published between 2020 and 2022, in the Google Scholar databases, SciELO (Scientific Electronic Library Online) and in the Federal Nursing Council Database. Results: To present the results on the repercussions of the COVID-19 pandemic on the mental health of nursing professionals, 03 thematic categories were used, namely: (1) Mental illness in the face of the pandemic; (2) Impacts of the COVID 19 pandemic on the mental health of nursing professionals and (3) Methods of combat and confrontation. Conclusion: It was evidenced that, during the pandemic, nursing professionals were in emotional and work overload, causing anxiety, occupational stress, Burnout Syndrome, fatigue, obsessive-compulsive disorder, post-traumatic stress disorder and moral distress. Thus, it is necessary to maintain and create prevention strategies to protect mental health during and after the pandemic.

KEYWORDS: nursing, health professionals, COVID-19, pandemic, mental health

Os cuidados e desafios do enfermeiro nas consultas de puericultura na atenção básica de saúde

The care and challenges of nurses in childcare consultations in primary health care

Montenegro, Claudine Ferreira^a, Ferreira, Daiana Silveira^a, Dias, Marcos Roberto Santos^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

O enfermeiro, através da consulta de Enfermagem na puericultura, pode oferecer as ações prioritárias em sua plenitude e promover a saúde integral da criança. Na primeira consulta de Enfermagem, será avaliada a interação da mãe com o bebê, a identificação de situações de risco ou intercorrências, além das orientações para o planejamento familiar. Objetivo: Identificar os cuidados e desafios do enfermeiro nas consultas de puericultura na atenção básica de saúde da criança. Metodologia: Pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2015 e 2020. Realizou-se uma busca *online* na Base de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Consideraram-se 13 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Evidenciou-se que, por um lado, os cuidados do enfermeiro na puericultura baseiam-se em consultas individualizadas e globais, assistência humanizada e de qualidade, ações educativas, prevenção de acidentes, dentre outros, por outro lado, como desafios destacam-se a falta de protocolos e fichas de fácil aplicabilidade, escassez de registros, fragilidades na assistência ao neonato, e outros. Conclusão: O enfermeiro é responsável por elaborar estratégias para a criança crescer bem e vir a ser um adulto saudável fisiológica e psicologicamente, sendo necessária a cooperação e consciência familiar para procurar os serviços na unidade básica de saúde precocemente. Com a prevenção e comprometimento da família com a equipe de saúde na atenção primária, se a criança adoecer por algo não tratável ela será encaminhada aos serviços da atenção de média e alta complexidade.

PALAVRAS-CHAVE: puericultura, enfermagem, saúde da criança, estratégia saúde da família, atenção primária

ABSTRACT

The nurse, through the Nursing consultation in childcare, can offer the priority actions in their fullness and promote the integral health of the child. In the first Nursing consultation, the mother's interaction with the baby will be evaluated, identification of risk situations or complications, in addition to family planning guidelines. Objective: To identify the care and challenges of nurses in childcare consultations in primary health care for children. Methodology: A descriptive, bibliographic review, built from materials published between 2015 and 2020. An online search was carried out in the Virtual Health Library Database. We considered 13 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: It was evidenced that, on the one hand, the nurse's care in childcare is based on individualized and global consultations, humanized and quality assistance, educational actions, accident prevention, among others, on the other hand, as challenges stand out: if the lack of easily applicable protocols and forms, scarcity of records, weaknesses in newborn care, and others. Conclusion: The nurse is responsible for developing strategies for the child to grow well and become a physiologically and psychologically healthy adult, requiring cooperation and family awareness to seek services at the basic health unit early. With the prevention and commitment of the family to the health team in primary care, if the child becomes ill due to something untreatable, he will be referred to the services of medium and high complexity care.

KEYWORDS: childcare, nursing, child health, family health strategy, primary care

Saúde da mulher: Métodos não farmacológicos para o alívio da dor no trabalho de parto

Women's health: Non-pharmacological methods for pain relief in labor

Jesus, Emelly Patrocínio dos Santos de^a, Silveira, Fabiana Soares da^a, Soares, Grazielle de Sousa^a, Araújo, Ivan Reno^a, Santos, Jonathan Richard dos^a, Borçari, Nathalia Rurder^b, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

A gravidez é um período marcante na vida da mulher, pois as modificações complexas e individuais, que variam entre elas, podem propiciar medo, dúvidas, angústias e curiosidade a respeito das mudanças com seu corpo. O medo da dor no trabalho de parto é a principal queixa das parturientes, e as acompanham no período gestacional e início do processo de parturição. Assim, os métodos não farmacológicos têm o intuito de amenizar a dor e trazer a cultura de que o parto natural pode acontecer de maneira humanizada. Objetivo: Compreender como os métodos não farmacológicos contribuem para o alívio da dor durante o trabalho de parto. Metodologia: Pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2012 e 2022. Realizou-se uma busca *online* nas Base de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Consideraram-se 24 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Na resposta ao objetivo do estudo, evidenciou-se tanto a importância da validação dos métodos não farmacológicos para o alívio da dor no trabalho de parto, quanto a apresentação dos seus efeitos para o alívio da dor no trabalho de parto, com destaque para a hidroterapia, aromaterapia e terapia floral, acupuntura e acupressão e a presença de acompanhante durante o processo de parturição e nascimento. Conclusão: Os diversos métodos não farmacológicos pesquisados neste estudo, não só possuem benefícios para o alívio da dor como também agem de forma a auxiliar a parturiente psicologicamente. Neste cenário a equipe multidisciplinar deve incentivar e orientar sobre os benefícios de tais métodos e o enfermeiro assumir um papel de liderança para a gestão e o emprego de tais práticas.

PALAVRAS-CHAVE: dor de parto, métodos não farmacológicos, parto

ABSTRACT

Pregnancy is a remarkable period in a woman's life, as the complex and individual changes, which vary between them, can lead to fear, doubts, anguish, and curiosity about changes in her body. The fear of pain in labor is the main complaint of parturient, and it accompanies them during the gestational period and the beginning of the parturition process. Thus, non-pharmacological methods are intended to alleviate pain and bring the culture that natural childbirth can happen in a humanized way. Objective: To understand how non-pharmacological methods contribute to pain relief during labor. Methodology: A descriptive, bibliographic review, built from materials published between 2012 and 2022. An online search was carried out in the Virtual Health Library Database. We considered 24 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: In response to the objective of the study, the importance of validating non-pharmacological methods for pain relief in labor was highlighted, as well as the presentation of their effects for the relief of pain in labor, with emphasis on hydrotherapy, aromatherapy and floral therapy, acupuncture and acupressure and the presence of a companion during the parturition and birth process. Conclusion: The various non-pharmacological methods researched in this study not only have benefits for pain relief but also act to help the parturient psychologically. In this scenario, the multidisciplinary team should encourage and advise on the benefits of such methods and the nurse should assume a leadership role in the management and use of such practices.

KEYWORDS: labor pain, non-pharmacological methods, childbirth

Atuação do enfermeiro na profilaxia de sepse em pacientes adultos internados

Nurses' role in the prophylaxis of sepsis in hospitalized adult patients

Fernandes, Antonia^a, Viana, Julia Lorrany^a, Tavares, Luana^a, Moreira, Lucimar^a, Silva, Nayane da^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

Atualmente a sepse é entendida como uma disfunção orgânica potencialmente fatal, causada por uma resposta desregulada do hospedeiro a uma infecção, cujas elevadas taxas de morbidade e mortalidade requerem a adoção de medidas urgentes para seu enfrentamento, em virtude de suas implicações na saúde coletiva e individual. Assim, o enfermeiro, como responsável pela equipe de enfermagem, deve adotar a abordagem sistematizada na assistência de enfermagem, para a detecção precoce da sepse. Objetivo: Descrever a atuação do enfermeiro na profilaxia de sepse em pacientes adultos internados. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, construída a partir de materiais publicados entre 2014 e 2022. Para seleção dos textos foi feito um levantamento na *internet*, utilizando as bases de dados da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). As Palavras-chave investigadas foram: Sepse; Enfermagem; Profilaxia. Resultados: Evidenciou-se que a atuação do enfermeiro na profilaxia de sepse em pacientes adultos internados envolve: identificar o quadro clínico de sepse, avaliar a necessidade de instaurar o protocolo de assistência para controle da sepse; realizar o diagnóstico de enfermagem; realizar intervenções de enfermagem. Conclusão: A enfermagem deve atuar com o pensamento clínico e reflexivo, sobretudo na fase inicial do quadro de sepse, no qual os sinais apresentados são indícios indispensáveis na sobrevida do paciente, uma vez que o diagnóstico tardio compromete a sobrevida. Desse modo, o enfermeiro deve reconhecer esses sinais para que seja possível intervir rapidamente, para que assim, possa contribuir com a estabilização do quadro clínico e consiga minimizar a ocorrência de óbito.

PALAVRAS-CHAVE: sepse, enfermagem, profilaxia

ABSTRACT

Currently, sepsis is understood as a potentially fatal organic dysfunction, caused by a deregulated response of the host to an infection, whose high rates of morbidity and mortality require the adoption of urgent measures to face it, due to its implications for collective and individual health. Thus, the nurse, as responsible for the nursing team, must adopt a systematic approach in nursing care, for the early detection of sepsis. Objective: To describe the role of nurses in the prophylaxis of sepsis in hospitalized adult patients. Methodology: This is a literature review, built from materials published between 2014 and 2022. To select the texts, a survey was carried out on the internet, using the databases of the VHL (Virtual Health Library). The Keywords investigated were Sepsis; Nursing; Prophylaxis. Results: It was evidenced that the nurse's role in the prophylaxis of sepsis in hospitalized adult patients involves identifying the clinical picture of sepsis, evaluating the need to establish the assistance protocol to control sepsis; perform the nursing diagnosis; perform nursing interventions. Conclusion: Nursing must act with clinical and reflective thinking, especially in the initial phase of sepsis, in which the signs presented are essential signs of patient survival, since late diagnosis compromises survival. Thus, nurses must recognize these signs so that it is possible to intervene quickly, so that they can contribute to the stabilization of the clinical picture and manage to minimize the occurrence of death.

KEYWORDS: sepsis, nursing, prophylaxis

Hipotermia no pós-operatório imediato

Immediate postoperative hypothermia

Barbosa, Angélica Sousa^a, Macedo, Liliane de Oliveira^a, Xavier, Monica Ester Miguel Malta^a, Santos, William Silva^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

Hipotermia é caracterizada pela a temperatura corporal/ central menor que 36°C. No pós-operatório imediato, período até as primeiras 24 horas após o procedimento, o paciente pode apresentar hipotermia, assim, o profissional de enfermagem deve observar e reconhecer os seus sinais e sintomas. Objetivo: Identificar os cuidados de enfermagem aos pacientes com hipotermia no pós-operatório imediato. Metodologia: Pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2009 e 2020. Realizou-se uma busca *online* nas Base de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Consideraram-se 06 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Evidenciou-se que os cuidados de enfermagem aos pacientes com hipotermia no pós-operatório imediato estão intimamente ligados a identificação precoce dos fatores que a desencadeiam, como por exemplo, complicações cirúrgicas (arritmias cardíacas e anormalidades de coagulação); anestésicos utilizados; tempo cirúrgico acima do esperado, e perda de calor para o ambiente pela infusão de líquidos frios, temperatura das salas cirúrgicas, abertura da cavidade abdominal, pertencimento aos grupos de risco (mulheres, recém-nascidos, idosos e pessoas com comorbidades). Conclusão: Discutir e entender a hipotermia no período pós-operatório é de grande relevância para a enfermagem, pois trata-se de uma complicação de grande importância, devido a temperatura corporal ser valiosa para manter as funções vitais do corpo humano. É essencial que os profissionais de enfermagem estejam capacitados atender os indivíduos nessa situação.

PALAVRAS-CHAVE: hipotermia, complicações da hipotermia no pós-operatório imediato, enfermagem

ABSTRACT

Hypothermia is characterized by body/core temperature below 36°C. In the immediate postoperative period, up to the first 24 hours after the procedure, the patient may have hypothermia, so the nursing professional must observe and recognize its signs and symptoms. Objective: To identify nursing care for patients with hypothermia in the immediate postoperative period. Methodology: A descriptive, bibliographic review, built from materials published between 2009 and 2020. An online search was carried out in the Virtual Health Library Database. We considered 06 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: It was evidenced that nursing care for patients with hypothermia in the immediate postoperative period is closely linked to the early identification of triggering factors, such as surgical complications (cardiac arrhythmias and coagulation abnormalities); anesthetics used; surgical time longer than expected, and heat loss to the environment due to the infusion of cold liquids, temperature of the operating rooms, opening of the abdominal cavity, belonging to risk groups (women, newborns, the elderly and people with comorbidities). Conclusion: Discussing and understanding hypothermia in the postoperative period is of great relevance to nursing, as it is a very important complication, since body temperature is valuable for maintaining the vital functions of the human body. It is essential that nursing professionals can assist individuals in this situation.

KEYWORDS: hypothermia, complications of hypothermia in the immediate postoperative period, nursing

Depressão na adolescência: Desenvolvimento, manifestação e atuação do enfermeiro

Depression in adolescence: Development, manifestation and performance of nurses

Reis, Adriana dos Santos Soares Nascimento^a, Silva, Bruna Lima do Rosário da^a, Santos, Ellen Ester Oliveira^a, Sedano, Eliene Pereira da Silva^a, Dias, Elizabete de Souza^a, Silva, Edneia Lima da^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU
b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a adolescência, compreende a idade biofisiológica entre os 10 e 19 anos. Dentre os agravamentos mais prevalentes entre adolescentes, estão os episódios depressivos. Portanto, é necessário tanto entender os aspectos do desenvolvimento e manifestação de transtornos depressivos em adolescentes quanto o papel do enfermeiro na prevenção da depressão na adolescência. Objetivo: Compreender os aspectos envolvidos no desenvolvimento e na manifestação da depressão na adolescência e a atuação do enfermeiro na sua saúde mental. Metodologia: Pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2002 e 2021. Realizou-se uma busca *online* na SciELO (*Scientific Electronic Library Online*), no *Google Acadêmico* e em revistas indexadas. Consideraram-se 12 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Para apresentação dos resultados utilizou-se 04 categorias temáticas, sendo: A Percepção dos Adolescentes sobre a Depressão; Os indicadores e a associação da depressão com vínculos afetivos e sociais; Conhecimento Clínico da Depressão na Adolescência; Atuação do Enfermeiro Diante das Necessidades de Saúde Mental dos Adolescentes. Conclusão: Ao enfermeiro são atribuídas tanto estratégias preventivas quanto recuperativas. Juntamente com a equipe multiprofissional, ele é responsável pela educação em saúde, ações promocionais, reconhecimento das manifestações características que norteiam o diagnóstico e tratamento precoce e colaboração para adesão e acompanhamento do adolescente ao plano terapêutico.

PALAVRAS-CHAVE: enfermagem psiquiátrica, cuidados psicossociais, depressão na adolescência

ABSTRACT

According to the World Health Organization, adolescence comprises the biophysiological age between 10 and 19 years. Among the most prevalent aggravations among adolescents are depressive episodes. Therefore, it is necessary to understand both aspects of the development and manifestation of depressive disorders in adolescents and the role of nurses in preventing depression in adolescence. Objective: To understand the aspects involved in the development and manifestation of depression in adolescence and the role of nurses in their mental health. Methodology: A descriptive, bibliographic review, built from materials published between 2002 and 2021. An online search was carried out on SciELO (*Scientific Electronic Library Online*), Google Scholar and indexed journals. We considered 12 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: Four thematic categories were used to present the results, namely: Adolescents' Perception of Depression; Indicators and association of depression with affective and social bonds; Clinical Knowledge of Depression in Adolescence; Nurses' performance in face of the Adolescents' Mental Health Needs. Conclusion: Nurses are assigned both preventive and recuperative strategies. Together with the multidisciplinary team, he is responsible for health education, promotional actions, recognition of the characteristic manifestations that guide early diagnosis and treatment, and collaboration for adherence and monitoring of the adolescent to the therapeutic plan.

KEYWORDS: psychiatric nursing, psychosocial care, depression in adolescence

Os cuidados de enfermagem na prevenção e no controle de infecções na corrente sanguínea

Nursing care in the prevention and control of bloodstream infections

Vargas, Leniza^a, Miguel, Luana Caetano^a, Santana, Mariana Santos^a, Alves, Mickaelly Monique^a, Rodrigues, Paulo Pacea, Pinho Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

Dentre as infecções mais comumente associadas à assistência de saúde nas Unidades de Terapias Intensivas (UTI) estão as Infecções Primárias de Corrente Sanguínea (IPCS). Estima-se que, aproximadamente, 60% dessas infecções estão relacionadas ao uso de Cateter Venoso Central (CVC), configurando-se como principal fator de risco. Assim, os cuidados de enfermagem devem estar presentes antes, durante e após a ocorrência de infecções na corrente sanguínea. Objetivo: Identificar os cuidados de enfermagem na prevenção e no controle de infecções na corrente sanguínea. Metodologia: Pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2016 e 2021. Realizou-se uma busca *online* no *Google Acadêmico*. Consideraram-se 04 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Entre todos, os cuidados de enfermagem na prevenção e no controle de infecções na corrente sanguínea destacam-se: Prevenção de Infecção primária e/ou relacionadas ao CVC em UTI; Prevenção e Controle das Infecções de Corrente Sanguínea; Orientações relacionadas aos formulários de notificação de indicadores referente ao Controle de Infecções; Habilidade da equipe de enfermagem no manuseio de cateteres, de acordo com os POPs (Protocolos Operacionais Padrão) institucional. Conclusão: A adoção, por parte dos profissionais da saúde, de um conjunto de medidas preventivas (*bundles*) e POPs, são essenciais para a prevenção e o controle de infecções na corrente sanguínea e, diminuição de intercorrências relacionadas a momentos antecedentes da inserção do CVC, durante a sua inserção e nos cuidados de manutenção e retirada desse dispositivo.

PALAVRAS-CHAVE: infecção, bactéria em unidade de terapia intensiva, corrente sanguínea

ABSTRACT

Among the infections most associated with health care in Intensive Care Units (ICU) are Primary Blood Stream Infections (IPCS). It is estimated that approximately 60% of these infections are related to the use of Central Venous Catheter (CVC), constituting the main risk factor. Thus, nursing care must be present before, during and after the occurrence of bloodstream infections. Objective: To identify nursing care in the prevention and control of bloodstream infections. Methodology: A descriptive, bibliographic review, built from materials published between 2016 and 2021. An online search was carried out on Google Scholar. We considered 04 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: Among all, nursing care in the prevention and control of infections in the bloodstream stands out: Prevention of primary and/or CVC-related infections in the ICU; Prevention and Control of Bloodstream Infections; Guidance related to Infection Control indicator notification forms; Ability of the nursing team in handling catheters, according to institutional SOPs (Standard Operating Protocols). Conclusion: The adoption, by health professionals, of a set of preventive measures (*bundles*) and POPs, are essential for the prevention and control of bloodstream infections and, reduction of intercurrents related to moments prior to the insertion of the CVC, during its insertion and in the care of maintenance and removal of this device.

KEYWORDS: infection, intensive care unit bacteria, bloodstream

Assistência de enfermagem à gestante no contexto do HIV/AIDS: construindo pontes e rompendo as barreiras

Nursing care for pregnant women in the context of HIV/AIDS: building bridges and breaking down barriers

Batista, Andreia Carvalho Ribeiro^a, Santiago, Andressa Barbosa^a, Assis, Raquel Madalena de^a, Borçari, Nathalia Ruder^b, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

Desde 2008 há um aumento do número de grávidas com HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) no Brasil, segundo dados do Boletim Epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde (MS). O HIV é uma IST (Infecção Sexualmente Transmissível) que causa preocupação quando se trata de gestantes, pois ela possui diversos fatores de risco para si própria e para o feto. Objetivo: Identificar as atribuições do enfermeiro a gestante no contexto do HIV/AIDS. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2017 e 2021. Para seleção dos textos foi realizada uma busca *online* nas Base de Dados da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e pesquisa livre de documentos oficiais no *site* do Ministério da Saúde. Consideraram-se 05 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Após a leitura interpretativa e a investigação temática da bibliografia potencial, para a apresentação dos resultados, optou-se pela descrição das publicações de acordo com a relevância do seu conteúdo. Evidenciou-se que o enfermeiro deve estar atento as particularidades do cuidado e capacitado para prestá-lo, acolher a gestante no momento do diagnóstico, proporcionar todas as informações sobre a patologia, oferecer assistência integral, humanizada e livre de preconceitos, dentre outros. Conclusão: A presença do enfermeiro durante o cuidado da gestante com HIV/AIDS se torna uma necessidade extremamente importante, uma vez que proporciona cuidado centrado na mulher, de forma integral, qualificada, humanizada, respeitosa e livre de preconceitos e julgamentos.

PALAVRAS-CHAVE: gestante, HIV/AIDS, enfermagem

ABSTRACT

Since 2008 there has been an increase in the number of pregnant women with HIV (Human Immunodeficiency Virus) in Brazil, according to data from the Epidemiological Bulletin released by the Ministry of Health (MS). HIV is an STI (Sexually Transmitted Infection) that causes concern when it comes to pregnant women, as it has several risk factors for itself and the fetus. Objective: To identify the nurse's attributions to pregnant women in the context of HIV/AIDS. Methodology: This is a descriptive, bibliographic review research, built from materials published between 2017 and 2021. To select the texts, an online search was carried out in the VHL Database (Virtual Health Library) and a free search of official documents on the Ministry of Health website. We considered 05 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: After the interpretative reading and thematic investigation of the potential bibliography, for the presentation of the results, it was decided to describe the publications according to the relevance of their content. It was evident that the nurse must be aware of the particularities of care and be able to provide it, welcome the pregnant woman at the time of diagnosis, provide all information about the pathology, offer comprehensive, humanized and prejudice-free care, among others. Conclusion: The presence of nurses during the care of pregnant women with HIV/AIDS becomes an extremely important need, since it provides care centered on women, in an integral, qualified, humanized, respectful and free from prejudice and judgment.

KEYWORDS: pregnant woman, HIV/AIDS, nursing

As ações de enfermagem na prevenção da gravidez na adolescência

Nursing actions in the prevention of teenage pregnancy

Lopes, Elisa Sakon^a, Maciel, Kelly Cristina Pereira^a, Oliveira, Laudo Nattel Gomes de^a,
Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

A adolescência é uma etapa da vida que demanda atenção especial, essa fase é compreendida entre a infância e a fase adulta, marcada por um complexo processo de crescimento e desenvolvimento biopsicossocial. Embora biologicamente o adolescente esteja apto para desenvolver a reprodução, eles ainda não estão preparados emocionalmente para a prática sexual. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil está entre os países latino-americanos com a maior média na região de bebês nascidos de mães adolescentes. Objetivo: Identificar as ações de enfermagem na prevenção da gravidez na adolescência considerando o contexto social que favorece o seu aumento. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2016 e 2021. Para seleção dos textos foi realizada uma busca *online* nas Base de Dados da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). Consideraram-se 07 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: evidenciou-se que as ações de enfermagem a serem desenvolvidas na prevenção da gravidez na adolescência, considerando o contexto social que favorece o seu aumento, incluem: a identificação dos fatores de risco e dificuldades encontradas na gravidez na adolescência e; a promoção de ações de saúde direcionada para os adolescentes. Conclusão: Diante das informações analisadas durante a revisão bibliográfica, sobre as ações do enfermeiro na prevenção de gravidez na adolescência. Foi possível explorar o contexto social que podem influenciar uma gravidez não planejada. E as ações de enfermagem que norteiam o cuidar das gestantes nesse período delicado que é a adolescência.

PALAVRAS-CHAVE: gravidez na adolescência, enfermagem, planejamento familiar

ABSTRACT

Adolescence is a stage of life that requires special attention, this stage is comprised between childhood and adulthood, marked by a complex process of biopsychosocial growth and development. Although the adolescent is biologically able to develop reproduction, they are not yet emotionally prepared for sexual practice. According to data from the World Health Organization (WHO), Brazil is among the Latin American countries with the highest average in the region of babies born to adolescent mothers. Objective: To identify nursing actions in the prevention of teenage pregnancy considering the social context that favors its increase. Methodology: This is a descriptive literature review, built from materials published between 2016 and 2021. To select the texts, an online search was carried out in the BVS Database (Virtual Health Library). We considered 07 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: it was evident that the nursing actions to be developed in the prevention of teenage pregnancy, considering the social context that favors its increase, include: the identification of risk factors and difficulties encountered in teenage pregnancy and the promotion of health actions aimed at adolescents. Conclusion: In view of the information analyzed during the literature review, on the actions of nurses in the prevention of teenage pregnancy. It was possible to explore the social context that can influence an unplanned pregnancy. And the nursing actions that guide the care of pregnant women in this delicate period that is adolescence.

KEYWORDS: adolescent pregnancy, nursing, family planning

Cuidados de enfermagem aos pacientes idosos vivendo com HIV/AIDS

Nursing care for elderly patients living with HIV/AIDS

Lima, Adriane Aparecida de^a, Silva, Joelma de Lima^a, Silva, Monique Kelly da^a, David, Rosana^b, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU
b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma doença grave que atinge o sistema imunológico do indivíduo afetado, é causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e varia desde uma fase inicial aguda até a fase final, caracterizada pela AIDS propriamente dita. Dentre os desafios científicos, políticos e sociais que o avanço da epidemia traz, está a mudança nas práticas e nos hábitos da população com 60 anos ou mais, devido a evolução do perfil epidemiológico da infecção neste grupo. Objetivo: Identificar os cuidados de enfermagem ao idoso com HIV/Aids. Metodologia: Trata-se de um estudo por revisão bibliográfica da literatura com uma abordagem sistemática, baseada nos artigos científicos encontrados em Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Os critérios de inclusão foram publicações disponíveis na íntegra, entre 2008 e 2018, e em consonância com a questão norteadora do estudo. E os critérios de exclusão deuse por incompatibilidade do tema e publicações não gratuitas. Resultados: Para apresentação dos resultados utilizou-se 02 categorias temáticas, sendo: A vivência dos idosos portadores do vírus HIV/Aids; e Assistência de enfermagem frente ao idoso portador do vírus HIV/Aids. Conclusão: Os idosos, estão vulneráveis ao HIV/Aids, e deveriam ter a percepção de si como indivíduos de risco, identificando-se nas informações sobre prevenção da HIV/Aids. Entende-se que o apoio familiar e dos profissionais de saúde, em uma visão multidisciplinar, sejam fontes de recursos para essas pessoas, direcionando-os para o acompanhamento individual e em grupo.

PALAVRAS-CHAVE: AIDS/HIV, idosos, enfermagem

ABSTRACT

Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) is a serious disease that affects the immune system of the affected individual, it is caused by the Human Immunodeficiency Virus (HIV) and varies from an acute initial phase to the final phase, characterized by AIDS itself. Among the scientific, political, and social challenges that the advance of the epidemic brings is the change in practices and habits of the population aged 60 years and over, due to the evolution of the epidemiological profile of the infection in this group. Objective: To identify nursing care for the elderly with HIV/AIDS. Methodology: This is a literature review study with a systematic approach, based on scientific articles found in Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences (LILACS) and Scientific Electronic Library Online (SCIELO). The inclusion criteria were publications available in full, between 2008 and 2018, and in line with the guiding question of the study. And the exclusion criteria were due to incompatibility of the theme and non-free publications. Results: To present the results, 02 thematic categories were used, namely: The experience of elderly people with HIV/Aids; and Nursing care for elderly people with HIV/Aids. Conclusion: The elderly is vulnerable to HIV/Aids and should have the perception of themselves as individuals at risk, identifying themselves in the information on HIV/Aids prevention. It is understood that family support and health professionals, in a multidisciplinary view, are sources of resources for these people, directing them to individual and group follow-up.

KEYWORDS: AIDS/HIV, elderly, nursing

A importância da brinquedoteca na recuperação de crianças hospitalizadas

The importance of the toy library in the recovery of hospitalized children

Brito, Camila de Oliveira^a, Barreto, Debora Silva^a, Castro, Thais Sousa de^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

O Ministério da Saúde desde de 2005 dispõe uma lei sobre a obrigatoriedade de instalações de brinquedoteca em unidades de saúde que oferecem atendimento pediátrico, dito isso, a hospitalização infantil muitas vezes pode se tornar um processo traumatizante para a criança, que vai gerar sentimentos negativos nela, como medo e ansiedade e, uma forma de minimizar esses sentimentos é a utilização de brinquedotecas, visto que, o brinquedo tem grande valor terapêutico, podendo auxiliar na sua recuperação. Objetivo: Identificar a importância da brinquedoteca e suas implicações na recuperação de crianças hospitalizadas. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2016 e 2021. Realizou-se uma busca *online* nas Base de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Consideraram-se 10 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Para apresentação dos resultados sobre a importância da brinquedoteca e suas implicações na recuperação de crianças hospitalizadas utilizou-se 03 categorias temáticas, sendo: (1) A hospitalização infantil e o sofrimento da criança; (2) A importância do brincar no ambiente hospitalar e; (3) Os benefícios da brinquedoteca para a criança hospitalizada. Conclusão: A brinquedoteca é fundamental para promoção à saúde da criança hospitalizada, favorecendo a sua recuperação e, melhorando o seu bem-estar, humor e, expressão de sentimentos, além de minimizar o estresse causado pela internação. Também foi verificado que o brincar, melhora na comunicação do paciente com o profissional, facilitando na realização de procedimentos.

PALAVRAS-CHAVE: brinquedoteca hospitalar, criança hospitalizada, ludoterapia

ABSTRACT

The Ministry of Health since 2005 has a law on the obligation of toy library facilities in health units that offer pediatric care, that said, child hospitalization can often become a traumatic process for the child, which will generate negative feelings in them. , such as fear and anxiety, and a way to minimize these feelings is the use of toy libraries, since the toy has great therapeutic value and can help in their recovery. Objective: To identify the importance of the toy library and its implications for the recovery of hospitalized children. Methodology: This is a descriptive literature review, built from materials published between 2016 and 2021. An online search was carried out in the Virtual Health Library Database. We considered 10 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: To present the results on the importance of the toy library and its implications for the recovery of hospitalized children, 03 thematic categories were used, namely: (1) Child hospitalization and child suffering; (2) The importance of playing in the hospital environment and (3) The benefits of the toy library for the hospitalized child. Conclusion: The toy library is essential for promoting the health of hospitalized children, favoring their recovery, and improving their well-being, mood, and expression of feelings, in addition to minimizing the stress caused by hospitalization. It was also found that playing improves communication between the patient and the professional, facilitating the performance of procedures.

KEYWORDS: hospital toy library, hospitalized child, play therapy

As responsabilidades da equipe de enfermagem na promoção da saúde e prevenção de doenças na primeira infância

The responsibilities of the nursing team in health promotion and disease prevention in early childhood

Almeida, Emily Hitzschky de^a, Barroso, Jéssica Maia^a, Ribeiro, Natalia Passos^a, França, Nicolay Lohayne Marcondes Pinto^a, Carmo, Thiago Líbano do^a, Silva, Kainan Douglas dos Santos^b, Pinho, Maria Carla Vieira^c

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU
b. Preceptor de Estágio do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

c. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

No Brasil o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento na saúde da criança teve início com o Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança (PAISC), criado em 1984, devido à alta taxa de mortalidade infantil. Atualmente a equipe de saúde da família é responsável pelas consultas de puericultura, que tem como objetivo acompanhar o crescimento e desenvolvimento infantil, bem como detectar possíveis complicações de forma precoce, atuando desta forma na prevenção e promoção à saúde. Objetivo: Identificar as responsabilidades da equipe de enfermagem na promoção da saúde e prevenção de doenças na primeira infância. Metodologia: Pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, realizada eletronicamente, construída a partir de materiais publicados entre 2012 e 2021. Realizou-se uma busca *online* nas Bases de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Consideraram-se 05 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Evidenciou-se a equipe de enfermagem deve: Orientar a mãe e responsáveis sobre a importância do acompanhamento desde o pré-natal até as consultas com pediatra e especialistas; Facilitar a comunicação entre família e profissional; Realizar cuidados e prevenção de doenças na primeira infância e visitas de enfermagem; Registrar as informações e acompanhamento do desenvolvimento infantil, dentre outros. Conclusão: O diagnóstico precoce de doenças aumenta em 90% a taxa de efetividade do tratamento, e esse diagnóstico ocorre se houver orientações de toda equipe de saúde, principalmente da enfermagem, fazendo necessário o comprometimento e estruturação dos serviços atenção primária, da atenção de média e alta complexidade.

PALAVRAS-CHAVE: prevenção, promoção à saúde da criança, primeira infância, enfermagem

ABSTRACT

In Brazil, the monitoring of growth and development in children's health began with the Comprehensive Assistance Program for Children's Health (PAISC), created in 1984, due to the high infant mortality rate. Currently, the family health team is responsible for childcare consultations, which aim to monitor the child's growth and development, as well as detect possible complications early, thus acting in the prevention and promotion of health. Objective: To identify the responsibilities of the nursing team in health promotion and disease prevention in early childhood. Methodology: Bibliographic review research, descriptive, carried out electronically, built from materials published between 2012 and 2021. An online search was carried out in the Databases of the Virtual Health Library. We considered 05 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: It was evident that the nursing team should: Guide the mother and guardians about the importance of monitoring from prenatal care to consultations with pediatricians and specialists; Facilitate communication between family and professional; Carry out care and prevention of diseases in early childhood and nursing visits; Record information and follow-up on child development, among others. Conclusion: Early diagnosis of diseases increases the rate of treatment effectiveness by 90%, and this diagnosis occurs if there are guidelines from the entire health team, especially from nursing, making it necessary to commit and structure primary care services, middle care, and high complexity.

KEYWORDS: prevention, child health promotion, early childhood, nursing

Papel da enfermagem no acolhimento ao paciente com esquizofrenia

Role of nursing in welcoming patients with schizophrenia

Santos, Beatriz Almeida Bispo dos^a, Oliveira, Elizama Silva de^a, Silva, Rodrigo Pereira da^a, Alves, Samara Aparecida da Silva^a, Santos, Thiago Leite dos^b, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

A esquizofrenia é uma doença mental crônica e incapacitante, caracterizada por sintomas psicóticos, que inclui delírios, alucinações e comportamentos desorganizados, sendo apontada como a terceira causa de perda da qualidade de vida entre as idades de 15 e 44 anos. A causa é desconhecida, mas há fortes evidências de fatores genético e ambientais. Seu tratamento é feito com medicações, terapia cognitiva e reabilitação psicossocial. Objetivo: Identificar o papel da enfermagem no acolhimento ao paciente com esquizofrenia. Metodologia: Pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2008 e 2021. Para seleção dos textos foi realizada uma busca *online* nas Base de Dados Biblioteca Virtual em Saúde. Consideraram-se 11 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Para apresentação dos resultados discutiu-se 06 categorias temáticas, sendo: (1) A percepção dos profissionais de enfermagem na assistência ao paciente esquizofrênico; (2) Assistência de enfermagem ao familiar/cuidador da pessoa com esquizofrenia; (3) Atividade da enfermagem na assistência do paciente esquizofrênico; (4) Compreensão da qualidade de vida da pessoa com esquizofrenia; (5) Desafios da assistência à pessoa com esquizofrenia; e; (6) O cuidado da enfermagem na assistência ao paciente esquizofrênico. Conclusão: O papel da enfermagem no acolhimento ao paciente com esquizofrenia é importante desde o seu primeiro contato e o cuidado junto à família é importante e útil para evolução e inserção do paciente no convívio social, possibilitando que ele se sinta parte da sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: cuidados, enfermagem, saúde mental, esquizofrenia, família

ABSTRACT

Schizophrenia is a chronic and disabling mental illness characterized by psychotic symptoms, which include delusions, hallucinations, and disorganized behaviors, being identified as the third cause of loss of quality of life between the ages of 15 and 44 years. The cause is unknown, but there is strong evidence for genetic and environmental factors. Its treatment is done with medications, cognitive therapy, and psychosocial rehabilitation. Objective: To identify the role of nursing in welcoming patients with schizophrenia. Methodology: A descriptive, bibliographic review research, built from materials published between 2008 and 2021. To select the texts, an online search was carried out in the Virtual Health Library Database. We considered 11 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: To present the results, 06 thematic categories were discussed, namely: (1) The perception of nursing professionals in the care of schizophrenic patients; (2) Nursing care for the family member/caregiver of the person with schizophrenia; (3) Nursing activity in the care of schizophrenic patients; (4) Understanding the quality of life of people with schizophrenia; (5) Challenges of caring for people with schizophrenia; and; (6) Nursing care in the care of schizophrenic patients. Conclusion: The role of nursing in welcoming patients with schizophrenia is important from their first contact and care with the family is important and useful for the evolution and insertion of the patient in social life, allowing him to feel part of society.

KEYWORDS: care, nursing, mental health, schizophrenia, family

O papel do enfermeiro no acolhimento do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)

The role of the nurse in the reception of the Psychosocial Care Center (CAPS)

Santos, Bruna Ramalho dos^a, Fernandes, Érika Patrícia^a, Bertolucci, Geane^a, Josic, Gustavo Fontes^a, Jesus, Ludimila Pereira de^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU
b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

A saúde mental é uma medida utilizada para retratar o nível de qualidade de vida, cognitiva ou emocional, e está de acordo com as exigências da vida, do saber encarar as emoções positivas e negativas, saber distinguir próprios limites e procurar apoio, quando preciso. A enfermagem, por suas características técnica e de trabalho, com autonomia, atendimento humanizado e consolidação dos elos interdisciplinares nos processos terapêuticos do doente mental, é fundamental para a elaboração de novos modelos na qualidade do atendimento para este paciente, em especial nos Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS). Objetivo: Identificar o papel do enfermeiro no acolhimento das pessoas atendidas nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2002 e 2022. Para seleção dos textos foi realizada uma busca *online* nas Base de Dados da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) eSciELO (*Scientific Electronic Library Online*). Consideraram-se 15 publicações que atenderam a temática do estudo, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Para apresentação dos resultados sobre o papel do enfermeiro utilizou-se 02 categorias temáticas, sendo: (1) Contexto da criação e trajetória do CAPS; (2) Atribuição do Enfermeiro no CAPS. Conclusão: O papel do enfermeiro no Centro de Acolhimento Psicossocial (CAPS) é fundamental para o seu funcionamento e o acolhimento do paciente com sofrimento mental ao longo da vida, pois historicamente este serviço apresenta dificuldades para manter essas pessoas em tratamento. O enfermeiro com o apoio da equipe interdisciplinar, com acolhimento universal e incondicional ao paciente e seus familiares e, respeitando a especificidade e particularidade de cada um, é capaz de promover a reabilitação e reinserir socialmente o paciente.

PALAVRAS-CHAVE: enfermagem, saúde Mental, CAPS, acolhimento, humanização

ABSTRACT

Mental health is a measure used to portray the level of quality of life, cognitive or emotional, and is in accordance with the demands of life, of knowing how to face positive and negative emotions, knowing how to distinguish one's limits and seek support when needed. Nursing, due to its technical and work characteristics, with autonomy, humanized care, and consolidation of interdisciplinary links in the therapeutic processes of the mentally ill, is fundamental for the elaboration of new models in the quality of care for this patient, especially in the Care Center. Psychosocial (CAPS). Objective: To identify the role of nurses in welcoming people assisted in Psychosocial Care Centers (CAPS). Methodology: This is a descriptive bibliographic review, built from materials published between 2002 and 2022. To select the texts, an online search was carried out in the BVS Database (Virtual Health Library) and SciELO (Scientific Electronic Library Online). We considered 15 publications that met the theme of the study, with full texts available, in Portuguese. Conclusion: The role of the nurse in the Psychosocial Reception Center (CAPS) is fundamental for its functioning and the reception of the patient with mental suffering throughout life, because historically this service presents difficulties to keep these people in treatment. The nurse with the support of the interdisciplinary team, with universal and unconditional reception to the patient and their families and, respecting the specificity and particularity of each one, can promote rehabilitation and socially reinsert the patient.

KEYWORDS: nursing, mental health, CAPS, reception, humanization

Atribuições da enfermagem no uso de métodos não farmacológicos e suas contribuições no alívio da dor durante o trabalho de parto

Nursing assignments in the use of non-pharmacological methods and their contributions to pain relief during labor

Carvalho, Fernanda dos Santos^a, Alves, Ingrid^a, Serafim, Larissa de Oliveira^a, Marinho, Simone^a, Borçari, Nathalia Ruder^b, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU
b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

O momento do parto é um dos momentos mais importantes para uma família. A assistência de enfermagem frente a esse evento familiar é extremamente significativa e tem o poder de ditar o rumo que será seguido de acordo com as suas práticas e intervenções. A dor é considerada o quinto sinal vital e é nela que o enfermeiro precisa se atentar para que o trabalho de parto seja conduzido da melhor forma, oferecendo dentro de suas possibilidades, métodos diversos para o alívio dela. Objetivo: Identificar as ações de enfermagem no manejo da dor no trabalho de parto a partir dos métodos não farmacológicos. Metodologia: Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica, descritiva, realizada eletronicamente, a partir das bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Após análise dos resultados, quanto aos critérios de escolha, consideraram-se as publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, sendo artigos científicos ou teses, nos idiomas português e publicadas entre 2017 e 2022. Como critérios de exclusão foram adotados a fuga da temática e os artigos em duplicidade. Após a aplicação de tais critérios obteve-se 8 estudos para a pesquisa. Resultados: Para apresentação dos resultados utilizou-se 03 categorias temáticas, sendo: (1) Humanização na assistência ao parto (2) Assistência do enfermeiro frente ao parto (3) Práticas não invasivas no alívio da dor na parturição. Considerações finais: Os métodos não farmacológicos para alívio da dor são inúmeros e sua utilização é de extrema importância pois minimizam as chances de uma cesárea iminente e proporcionam maior bem-estar e conexão da parturiente durante o processo do nascimento.

PALAVRAS-CHAVE: alívio de dor, parto, humanização, enfermagem obstétrica, assistência enfermagem

ABSTRACT

Giving birth is one of the most important moments for a family. Nursing care in the face of this family event is extremely significant and has the power to dictate the course that will be followed according to its practices and interventions. Pain is considered the fifth vital sign and it is there that the nurse needs to pay attention so that the labor is conducted in the best way, offering, within their possibilities, different methods for its relief. Objective: To identify nursing actions in the management of pain in labor from non-pharmacological methods. Methodology: This was descriptive bibliographic research, carried out electronically, using the Virtual Health Library (BVS) databases. After analyzing the results, regarding the selection criteria, publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, being scientific articles or theses, in Portuguese and published between 2017 and 2022 were considered. of exclusion, the escape of the theme and the duplicated articles were adopted. After applying such criteria, 8 studies were obtained for the research. Results: To present the results, 03 thematic categories were used, as follows: (1) Humanization in childbirth care (2) Nurse assistance during childbirth (3) Non-invasive practices to relieve pain during childbirth. Final considerations: There are numerous non-pharmacological methods for pain relief and their use is extremely important because they minimize the chances of an imminent cesarean section and provide greater well-being and connection to the parturient during the birth process.

KEYWORDS: pain relief, childbirth, humanization, obstetric nursing, nursing care

Qualidade e segurança na administração de medicamentos de alta vigilância em unidade de terapia intensiva: Drogas vasoativas

Quality and safety in high surveillance drug administration in an intensive care unit: Vasoactive drugs

Santos, Ana Paula Oliveira Farias^a, Santos, Nahara Luiza Ribeiro dos^a, Souza, Samuel Alves de^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é uma unidade de alta complexidade, com pacientes em estado grave e que necessitam de cuidados contínuos. Dentre os medicamentos mais utilizados estão os de alta vigilância (drogas vasoativas). Devido ao alto grau de complexidade, o cuidado na qualidade da assistência deve ser garantido pela enfermagem, seguindo a meta internacional de segurança do paciente. Objetivo: Reconhecer pelo levantamento bibliográfico o papel do enfermeiro na aplicação de medidas de barreira para qualidade e segurança na administração de medicamentos de alta vigilância (drogas vasoativas) no ambiente de terapia intensiva. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2015 e 2020. Buscaram-se nas Base de Dados da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) artigos da literatura nacional e internacional, que discorriam sobre a qualidade e segurança na assistência de enfermagem ao paciente internado na UTI em uso de drogas vasoativas. Consideraram-se 14 publicações. Resultados: Para apresentação dos resultados o papel do enfermeiro na aplicação de medidas de barreira para qualidade e segurança na administração de medicamentos de alta vigilância (drogas vasoativas) no ambiente de terapia intensiva. utilizou-se 02 categorias temáticas, sendo: (1) Cultura da Qualidade e Segurança do Paciente no Ambiente Hospitalar e; (2) Educação dos Profissionais na Administração de Drogas Vasoativas. Conclusão: As complicações dos erros de medicamentos podem ser letais quando não tratadas a tempo, sendo importante intervir precocemente nesse processo, evitando complicações ainda maiores e diminuindo o comprometimento funcional do organismo.

PALAVRAS-CHAVE: enfermagem, unidade de terapia intensiva, fármacos cardiovasculares, qualidade e segurança do paciente, medicamentos de alta vigilância

ABSTRACT

The Intensive Care Unit (ICU) is a highly complex unit, with patients in serious condition and in need of continuous care. Among the most used drugs are high surveillance drugs (vasoactive drugs). Due to the high degree of complexity, care in the quality of care must be guaranteed by nursing, following the international goal of patient safety. Objective: To recognize through the literature the role of nurses in the application of barrier measures for quality and safety in the administration of high surveillance drugs (vasoactive drugs) in the intensive care environment. Methodology: This is a descriptive bibliographic review, built from materials published between 2015 and 2020. Articles from national and international literature were searched in the BVS Database (Virtual Health Library), which discussed quality and safety in nursing care for patients hospitalized in the ICU using vasoactive drugs. Fourteen publications were considered. Results: To present the results, the nurse's role in the application of barrier measures for quality and safety in the administration of high surveillance drugs (vasoactive drugs) in the intensive care environment. 02 thematic categories were used, namely: (1) Culture of Quality and Patient Safety in the Hospital Environment and; (2) Education of Professionals in the Administration of Vasoactive Drugs. Conclusion: Complications from medication errors can be lethal when not treated in time, and it is important to intervene early in this process, avoiding even greater complications and reducing the functional impairment of the body.

KEYWORDS: nursing, intensive care unit, cardiovascular drugs, quality and patient safety, high surveillance medicines

Fatores que contribuem para o aumento do contágio de HIV/AIDS entre os adolescentes

Factors that contribute to the increase in HIV/AIDS infection among teenagers

Alves, Emily^a, Melo, Fabio Brandão^a, Santana, Jonathan Gonçalves Nascimento^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU
b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

A AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), doença causada pelo HIV (Vírus Imunodeficiência Adquirida), teve o primeiro caso registrado no Brasil em 1980, trazendo um grande desafio para saúde pública. Em 2022, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) cerca de 1,8 milhões crianças e adolescentes com idades próximas a 15 anos convivem com o HIV e elas têm iniciado a vida sexual cada vez mais cedo e, muitas vezes sem conhecimento sobre o vírus. Objetivo: Identificar, por meio de revisão bibliográfica, os fatores que contribuem para o aumento do contágio de HIV/AIDS entre os adolescentes. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2009 e 2022. Realizou-se uma busca *online* nas Base de Dados da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e *site* governamental. Consideraram-se 11 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Dentre os fatores que contribuem para o aumento do contágio de HIV/AIDS entre os adolescentes estão: os fatores hormonais, o desconforto dos jovens em falar sobre a sexualidade, a iniciação sexual cada vez mais cedo, a deficiência de programa de educação sexual, a carência de capacitação profissionais na abordagem da orientação sexual e identificação de casos de violência e, o desconhecimento pelo adolescente do uso do preservativo. Conclusão: Nota a necessidade de fortalecer políticas de educação sexuais especialmente para o adolescente, incentivar campanhas informativas sobre tema e, capacitar profissionais de saúde para a abordagem dos adolescentes em todos os níveis de atenção.

PALAVRAS-CHAVE: HIV, AIDS, história do HIV, forma de contágio do HIV, HIV entre adolescentes

ABSTRACT

AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome), a disease caused by HIV (Acquired Immunodeficiency Virus), had the first case registered in Brazil in 1980, bringing a great challenge to public health. In 2022, according to the World Health Organization (WHO) about 1.8 million children and adolescents aged close to 15 years are living with HIV and they have started their sexual life at an earlier age and often without knowledge about the disease. virus. Objective: To identify, through a literature review, the factors that contribute to the increase in HIV/AIDS contagion among adolescents. Methodology: This is a descriptive bibliographic review, built from materials published between 2009 and 2022. An online search was carried out in the BVS Database (Virtual Health Library) and government website. We considered 11 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: Among the factors that contribute to the increase in the contagion of HIV/AIDS among adolescents are hormonal factors, the discomfort of young people in talking about sexuality, sexual initiation at an earlier age, the deficiency of a sexual education program, the lack of professional training in approaching sexual orientation and identifying cases of violence, and the teenager's lack of knowledge about condom use. Conclusion: It notes the need to strengthen sexual education policies especially for adolescents, encourage information campaigns on the subject and train health professionals to approach adolescents at all levels of care.

KEYWORDS: HIV, AIDS, history of HIV, mode of HIV transmission, HIV among adolescents

Atuação da equipe de enfermagem na aplicação do checklist para uma cirurgia segura

Performance of the nursing team in the application of the checklist for a safe surgery

Santiago, Fabio Posso^a, Belda, Iuri Malowski^a, Brandao, Luis Phelipe Silva^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU
b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

O Centro Cirúrgico tem um alto nível de complexidade hospitalar, pelo cenário dinâmico e multiprofissional e, pela dependência direta de setores auxiliares para o sucesso no processo do cuidar, assim, gera um alto risco para a ocorrência de eventos adversos. Neste sentido, faz-se necessário a aplicação de lista de verificação, ou checklist, como uma ferramenta para a melhoria da segurança e o sucesso do processo cirúrgico. Objetivo: Identificar, por meio da revisão bibliográfica, a atuação da equipe de enfermagem na aplicação do checklist para uma cirurgia segura. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2010 e 2019. Para seleção dos textos foi realizada uma busca online nas Base de Dados Biblioteca Virtual em Saúde e SCIELO (Brasil Scientific Eletronic Library). Consideraram-se 05 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Sobre a atuação da equipe de enfermagem na aplicação do checklist para uma cirurgia segura evidenciou-se: o destaque da equipe de enfermagem neste processo, o reconhecimento da importância do checklist (timeout) para a segurança do paciente e sucesso no processo do cuidar e, a superação dos os fatores que dificultam o seguimento do protocolo de segurança na cirurgia. Conclusão: Há relevância da atuação da equipe de enfermagem para a segurança do paciente no Centro Cirúrgico, especialmente no seguimento das metas e protocolos internacionais sobre cirurgia segura. Mas, o enfermeiro, deve a liderar a equipe, implementar a cultura de segurança do paciente e destacar-se como de orientador e gestor da execução dos protocolos institucionais.

PALAVRAS-CHAVE: centro cirúrgico, checklist, enfermagem

ABSTRACT

The Surgical Center has a high level of hospital complexity, due to the dynamic and multidisciplinary scenario and due to the direct dependence on auxiliary sectors for the success of the care process, thus generating a high risk for the occurrence of adverse events. In this sense, it is necessary to apply a checklist, as a tool to improve the safety and success of the surgical process. Objective: To identify, through a literature review, the performance of the nursing team in the application of the checklist for safe surgery. Methodology: This is a descriptive bibliographic review, built from materials published between 2010 and 2019. To select the texts, an online search was carried out in the Virtual Health Library Database and SCIELO (Scientific Electronic Library). We considered 05 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: Regarding the performance of the nursing team in the application of the checklist for a safe surgery, it was evidenced: the highlight of the nursing team in this process, the recognition of the importance of the checklist (timeout) for patient safety and success in the care process and, overcoming the factors that make it difficult to follow the safety protocol in surgery. Conclusion: There is relevance of the performance of the nursing team for patient safety in the Surgical Center, especially in compliance with international goals and protocols on safe surgery. But the nurse must lead the team, implement the patient safety culture, and stand out as an advisor and manager of the implementation of institutional protocols.

KEYWORDS: surgical center, checklist, nursing

Conduta e cuidados dos enfermeiros aos usuários de álcool e drogas nos Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS AD)

Conduct and care of nurses to alcohol and drug users in Psychosocial Care Centers (CAPS AD)

Fonseca, Elenir Rosa da^a, Silva, Flaviane da Cunha^a, Silva, Josivania Maria da^a, Braga, Teresa^b, Pinho, Maria Carla Vieira^c

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Preceptor de Estágio do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

c. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

Identificar que o modelo de assistência á saúde mental no Brasil é resultado de um exaustivo processo de luta social, portanto, fez-se necessário detectar a Conduta e Cuidados dos Enfermeiros aos Usuários de Álcool e Drogas nos Caps AD. Objetivo: Compreender, por meio da revisão bibliográfica a Conduta e Cuidados dos Enfermeiros aos Usuários de Álcool e Drogas nos Caps AD. Metodologia: Tratou-se de uma pesquisa de revisão bibliografica descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2002 e 2021. Para seleção dos textos foi realizada uma busca online nas Base de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Consideraram-se 10 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. As PALAVRAS-CHAVE investigadas foram: Saude Mental, Caps. AD, Conduta e Cuidados dos Enfermeiros. Resultados: Para apresentação dos resultados sobre a Condulta e Cuidados dos Enfermeiros aos Usuários de Álcool e Drogas nos Caps. AD, utilizou-se 02 categorias: (1) conhecimento das leis em saúde mental; (2) compreender conduta e cuidados dos enfermeiros nos Caps. AD. Conclusão: As necessidades básicas que afetam os Caps. AD, são várias, portanto, é essencial a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação da saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes da saúde das coletividades.

PALAVRAS-CHAVE: saúde mental, conduta e cuidados dos enfermeiros, Caps AD

ABSTRACT

To identify that the mental health care model in Brazil is the result of an exhaustive process of social struggle, therefore, it was necessary to detect the Conduct and Care of Nurses for Alcohol and Drug Users in Caps AD. Objective: To understand, through a literature review, the Conduct and Care of Nurses to Users of Alcohol and Drugs in Caps AD. Methodology: This was a descriptive literature review, built from materials published between 2002 and 2021. To select the texts, an online search was carried out in the Database Virtual Health Library. We considered 10 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. The KEYWORDS investigated were: Mental Health, Caps. AD, Conduct and Care of Nurses. Results: To present the results on the Conduct and Care of Nurses to Users of Alcohol and Drugs in Caps. AD, 02 categories were used: (1) knowledge of mental health laws; (2) understand the conduct and care of nurses in Caps. AD. Conclusion: The basic needs that affect Caps. AD, there are several, therefore, health promotion, disease prevention, diagnosis, treatment, rehabilitation, harm reduction and health maintenance are essential to develop comprehensive care that impacts the situation of the patient. people's health and autonomy and in the determinants and conditions of the health of collectivities.

KEYWORDS: mental health, nursing conduct and care, Caps AD

Atuação do enfermeiro na prevenção da depressão pós-parto

Nurses' role in the prevention of postpartum depression

Lavor, Angileidy Gomes^a, Neves, Camila Gouveia^a, Silva, Raquel Ruivo da^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

A fase do pós-parto ou puerperal é um momento importante na vida da mulher, pois ocorrem mudanças biológicas, físicas e emocionais, aumentando significativamente os riscos para o desencadeamento de doenças psicológicas. Os primeiros dias do pós-parto são retratados por uma série de sentimentos e expectativas que promovem instabilidade emocional. A depressão pós-parto (DPP) é um sério problema de saúde pública. A puérpera que a desenvolve está fragilizada emocionalmente e psicologicamente, prejudicando o seu meio social e o desenvolvimento pleno do recém-nascido. Objetivo: Identificar a atuação do enfermeiro na prevenção da Depressão Pós-Parto. Metodologia: Pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2014 e 2019. Realizou-se uma busca *online* nas Base de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Consideraram-se 70 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Evidenciou-se que o enfermeiro, como parte da equipe multiprofissional, deve estar atento à possibilidade de quadro depressivo no puerpério, identificar e sintomas e sinais, prestar assistência integral e humanizada com informações que minimizem os anseios e medos da cliente e família, dentre outros. Conclusão: Sendo a DPP uma doença que afeta a saúde materna, ela necessita de profissionais capacitados e treinados para detectar de forma precoce o surgimento dessa patologia. O profissional enfermeiro que atua diretamente na atenção primária é capaz de identificar os sinais e sintomas característicos da DPP e intervir o mais rápido possível, uma vez que este enfermeiro acompanha essa puérpera desde o início, no pré-natal.

Palavra-chave: enfermagem, assistência de enfermagem, sistematização da assistência de enfermagem, depressão pós-parto

ABSTRACT

The postpartum or puerperal phase is an important moment in a woman's life, as biological, physical, and emotional changes occur, significantly increasing the risks for the onset of psychological diseases. The first postpartum days are portrayed by a series of feelings and expectations that promote emotional instability. Postpartum depression (PPD) is a serious public health problem. The puerperal woman who develops it is emotionally and psychologically weakened, harming her social environment and the full development of the newborn. Objective: To identify the role of nurses in the prevention of Postpartum Depression. Methodology: A descriptive, bibliographic review, built from materials published between 2014 and 2019. An online search was carried out in the Virtual Health Library Database. We considered 70 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: It was evidenced that the nurse, as part of the multidisciplinary team, must be aware of the possibility of depression in the puerperium, identify symptoms and signs, provide comprehensive and humanized care with information that minimizes the client's and family's anxieties and fears, among others. Conclusion: Since PPD is a disease that affects maternal health, it needs qualified and trained professionals to detect early the emergence of this pathology. The professional nurse who works directly in primary care can identify the characteristic signs and symptoms of PPD and intervene as quickly as possible, since this nurse accompanies this puerperal woman from the beginning, during prenatal care.

KEYWORDS: nursing, nursing Care, systematization of nursing care, postpartum depression

O conhecimento do enfermeiro na assistência direta e nas complicações do paciente no pós-operatório de angioplastia

Nurses' knowledge of direct care and patient complications in the postoperative period of angioplasty

Paula, Ana Paula dos Santos Silveira de^a, Teixeira, Daniela da Silva^a, Silva, Gabriela Ferreira^a, Silva, Quitéria Maria Alves da^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

As doenças cardiovasculares apresentam-se como a principal causa de morbimortalidade nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, sendo o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) a principal causa de morte no Brasil. A angiografia é um exame que confirma o diagnóstico de IAM e a extensão da área cardíaca lesada e requer assistência especializada pelo enfermeiro. Objetivo: Identificar, por meio da revisão bibliográfica, o conhecimento do enfermeiro na assistência direta e nas complicações do paciente no pós-operatório de angioplastia. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2016 e 2021. Para seleção dos textos foi realizada uma busca *online* nas Base de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Consideraram-se 12 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português e espanhol. Resultados: Para apresentação dos resultados sobre O conhecimento do enfermeiro na assistência direta e nas complicações do paciente no pós-operatório de angioplastia utilizou-se 03 categorias temáticas, sendo: (1) Dominar os conceitos de Infarto Agudo do Miocárdio; (2) Assistir ao paciente em pré-operatório de angioplastia; (3) Compreender, juntamente com a equipe de enfermagem, as complicações da pós angioplastia. Conclusão: O enfermeiro que atua no setor de hemodinâmica deve capacitado técnica e cientificamente para atendimento tanto eletivo como complexo e de urgência e emergência. Para os procedimentos eletivos, o enfermeiro é responsável pelo controle da agenda e de cuidados específicos como as retiradas de introdutores e de cateteres de acesso arterial.

PALAVRAS-CHAVE: angioplastia, enfermagem, complicações, IAM

ABSTRACT

Cardiovascular diseases are the main cause of morbidity and mortality in the United States, Europe, and Brazil, with Acute Myocardial Infarction (AMI) being the main cause of death in Brazil. Angiography is an exam that confirms the diagnosis of AMI and the extent of the injured heart area and requires specialized assistance by the nurse. Objective: To identify, through a literature review, nurses' knowledge of direct care and patient complications in the postoperative period of angioplasty. Methodology: This is a descriptive literature review, built from materials published between 2016 and 2021. To select the texts, an online search was carried out in the Virtual Health Library Database. We considered 12 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese and Spanish. Results: To present the results on Nurses' knowledge of direct care and patient complications in the postoperative period of angioplasty, 03 thematic categories were used, as follows: (1) Mastering the concepts of Acute Myocardial Infarction; (2) Assist the patient in the preoperative period of angioplasty; (3) Understand, together with the nursing team, the complications of post angioplasty. Conclusion: The nurse who works in the hemodynamics sector must be technically and scientifically qualified for both elective and complex care and urgency and emergency care. For elective procedures, the nurse is responsible for controlling the schedule and specific care, such as the removal of introducers and arterial access catheters.

KEYWORDS: angioplasty, nursing, complications, IAM

Os benefícios dos métodos de higienização oral na diminuição do risco de pneumonia associada à ventilação mecânica em clientes de Unidades de Terapias Intensiva

The benefits of oral hygiene methods in reducing the risk of ventilator-associated pneumonia in clients of Intensive Care Units

Miranda, Rosa Maria Souza^a, Julião, Thainá Lima Silva^a, Rodrigues, Verônica Eugênio^a, Ferreira, Viviane de Oliveira^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU
b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

Ao longo dos anos, as pesquisas têm demonstrado a instalação de patologias orais e possíveis complicações sistêmicas, decorrentes da inadequada higienização oral em pacientes hospitalizados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), como exemplo, infecções gengivais e pneumonias. Assim, destaca-se a importância da higiene bucal para o bem-estar, para a prevenção de doenças e para a melhor recuperação do paciente com intubação oro traqueal internado em UTI. Objetivo: Identificar os benefícios dos métodos de higienização oral que minimizam o risco pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM) em clientes de Unidades de Terapias Intensivas. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2017 e 2022. Para seleção dos textos foi realizada uma busca *online* nas Base de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Consideraram-se 25 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Os benefícios dos métodos de higienização oral que minimizam o risco da PAVM em clientes de UTI envolvem, dentre outros, a prevenção da colonização do trato aero digestivo e da aspiração de secreções contaminadas para as vias aéreas inferiores, o seguimento de medidas para diagnóstico precoce de infecções e, a diminuição da mortalidade associada, dos altos custos relacionados a maior permanência em UTI e uso de antimicrobianos. Conclusão: A monitoração, descontaminação e inclusão da avaliação da cavidade oral na prescrição de enfermagem são vitais, destacando-se a importância do treinamento da equipe de enfermagem para que a higiene oral realizada com utilização rigorosa com técnica asséptica.

PALAVRAS-CHAVE: pneumonia, doenças periodontais, bactérias na cavidade bucal, higienização oral, ventilação mecânica

ABSTRACT

Over the years, research has shown the installation of oral pathologies and possible systemic complications, resulting from inadequate oral hygiene in patients hospitalized in Intensive Care Units (ICU), for example, gingival infections and pneumonia. Thus, the importance of oral hygiene is highlighted for the well-being, for the prevention of diseases and for the better recovery of the patient with orotracheal intubation admitted to the ICU. Objective: To identify the benefits of oral hygiene methods that minimize the risk of ventilator-associated pneumonia (VAP) in clients of Intensive Care Units. Methodology: This is a descriptive bibliographic review, built from materials published between 2017 and 2022. To select the texts, an online search was carried out in the Virtual Health Library Database. We considered 25 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: The benefits of oral hygiene methods that minimize the risk of VAP in ICU clients involve, among others, the prevention of colonization of the aerodigestive tract and the aspiration of contaminated secretions into the lower airways, the follow-up of diagnostic measures of infections and, the reduction of associated mortality, of the high costs related to longer stay in ICU and use of antimicrobials. Conclusion: Monitoring, decontamination, and inclusion of the evaluation of the oral cavity in the nursing prescription are vital, highlighting the importance of training the nursing team so that oral hygiene is performed with rigorous use with aseptic technique.

KEYWORDS: pneumonia, periodontal diseases, bacteria in the oral cavity, oral hygiene, mechanical ventilation

O papel do enfermeiro em cuidados paliativos em oncologia pediátrica

The nurse's role in palliative care in pediatric oncology

Oliveira, Andréa Andrade Barros^a, Fernandes, Diana Batista^a, Oliveira, Sílvia Andrade de, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o câncer é a primeira causa de morte por doença na população com idade entre 01 e 19 anos, tanto no Brasil quanto em países desenvolvidos. Quando diagnosticado precocemente, a estimativa de cura é de 80% dos casos, quando as possibilidades de cura se esgotam, surgem como alternativa os cuidados paliativos, que consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, para a melhoria da qualidade de vida do paciente e familiares, por meio da prevenção, alívio do sofrimento, identificação precoce, e avaliação e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Objetivo: Identificar a conduta do enfermeiro em cuidados paliativos em unidade pediátrica. Metodologia: Pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2016 e 2021. Realizou-se uma busca *online* nas Bases de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Consideraram-se 07 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Evidenciou-se que a conduta do enfermeiro em cuidados paliativos em unidade de oncologia pediátrica, é guiada pela sua formação e preparo durante a graduação, pela vivência profissional do enfermeiro e da equipe de enfermagem, pelas habilidades ou não de comunicação com as crianças e familiares e, necessidade de aprofundar os conhecimentos, para uma assistência digna e humana. Conclusão: Este estudo trouxe tanto a reflexão sobre o papel dos enfermeiros e futuros profissionais da enfermagem para a necessidade de uma assistência adequada e de qualidade, quanto a compreensão da importância do cuidado paliativo na área pediátrica.

PALAVRAS-CHAVE: cuidados paliativos, pediatria, enfermagem oncológica, enfermagem pediátrica oncológica

ABSTRACT

According to the National Cancer Institute, cancer is the leading cause of death from disease in the population aged between 1 and 19 years, both in Brazil and in developed countries. When diagnosed early, the estimate of cure is 80% of cases, when the possibilities of cure are exhausted, palliative care emerges as an alternative, which consists of assistance provided by a multidisciplinary team, to improve the patient's quality of life and family members, through prevention, relief of suffering, early identification, and evaluation and treatment of pain and other physical, social, psychological, and spiritual symptoms. Objective: To identify the behavior of nurses in palliative care in a pediatric unit. Methodology: Bibliographic review research, descriptive, built from materials published between 2016 and 2021. For An online search was carried out in the Databases of the Virtual Health Library. We considered 07 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: It was evidenced that the conduct of nurses in palliative care in a pediatric oncology unit is guided by their training and preparation during graduation, by the professional experience of nurses and nursing staff, by the skills or not of communication with children. and family members, and the need to deepen knowledge for a dignified and humane assistance. Conclusion: This study brought both a reflection on the role of nurses and future nursing professionals for the need for adequate and quality care, as well as an understanding of the importance of palliative care in the pediatric area.

KEYWORDS: palliative care, pediatrics, oncology nursing, pediatric oncology nursing

A importância da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) no processo do cuidado na enfermagem

The importance of the Brazilian Sign Language (LIBRAS) in the nursing care process

Almeida, Andreia Alves^a, Vallinhos, Elane Neves^a, Maia, Graziela dos Santos^a, Babarito, Thiago Weverton Lopes^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU
b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

Através da comunicação compartilhamos ideias, sentimentos, emoções e mensagens, mas quando há deficiência ou impossibilidade de ouvir, nem sempre a comunicação ocorre de forma clara. Para uma assistência de enfermagem de qualidade aos pacientes surdos, é preciso desempenhar uma comunicação efetiva e sem barreiras, para tanto, é necessário entender a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Objetivo: Identificar, por meio da revisão bibliográfica, a importância da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) no processo do cuidado na enfermagem. Metodologia: Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica, descritiva, realizada eletronicamente, procurando identificar a importância da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) na assistência de enfermagem. A pesquisa eletrônica se deu no período de fevereiro a abril de 2022. Para a realização dela, foram analisados artigos publicados em revistas científicas, utilizando as bases de dados da Biblioteca Virtual da Saúde. Resultados: Para a apresentação dos resultados sobre a importância da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) no processo do cuidado de enfermagem, utilizou-se 03 categorias, sendo: Transposição de Barreiras na Comunicação com Surdos, Assistência Efetiva e Humanizada ao Paciente Surdo, Difusão do Aprendizado da LIBRAS entre os Profissionais da Saúde. Conclusão: Visando o aperfeiçoamento assistência, com humanização e qualidade, a inserção da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) no processo do cuidado de enfermagem deve ser considerada um tema atual e relevante, especialmente, ao constatar que os profissionais de área da saúde não estão preparados, tendo dificuldade na comunicação e conhecimento sobre LIBRAS.

PALAVRAS-CHAVE: surdez, enfermagem, barreira na comunicação, LIBRAS

ABSTRACT

Through communication we share ideas, feelings, emotions, and messages, but when there is a deficiency or impossibility of listening, communication does not always occur clearly. For quality nursing care for deaf patients, it is necessary to perform effective and barrier-free communication, therefore, it is necessary to understand the Brazilian Sign Language (LIBRAS). Objective: To identify, through a literature review, the importance of the Brazilian Sign Language (LIBRAS) in the nursing care process. Methodology: It was a bibliographical, descriptive research, carried out electronically, seeking to identify the importance of the Brazilian Sign Language (LIBRAS) in nursing care. The electronic survey took place from February to April 2022. To carry it out, articles published in scientific journals were analyzed, using the Virtual Health Library databases. Results: To present the results on the importance of the Brazilian Sign Language (LIBRAS) in the nursing care process, 03 categories were used, namely: Transposition of Barriers in Communication with the Deaf, Effective and Humanized Assistance to the Deaf Patient, Diffusion of LIBRAS Learning among Health Professionals. Conclusion: Aiming at improving care, with humanization and quality, the insertion of the Brazilian Sign Language (LIBRAS) in the nursing care process should be considered a current and relevant topic, especially when it is verified that health professionals are not prepared, having difficulty in communication and knowledge about LIBRAS.

KEYWORDS: deafness, nursing, communication barrier, LIBRAS

O papel do enfermeiro na orientação da gestante acerca da violência obstétrica

The nurse's role in guiding pregnant women about obstetric violence

Rufino, Ana Paula^a, Martins, Dayane Ferreira^a, Sousa, Rafael Vieira de^a, Mathias, Rafaela de Godoy Almeida^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

A maternidade é um período de mudança para a mulher, sendo elas físicas ou psicológicas. A violência obstétrica pode ocorrer durante esse período, não limitando-se à mulher, mas também ao bebê e aos familiares, podendo levar a danos físicos, psicológicos e sexuais. A enfermagem obstétrica pode auxiliar a parturiente, fazendo com que essa fase seja agradável e respeitosa, informando-a e orientando-a fisicamente e psicologicamente para o trabalho de parto e parto. Objetivo: Identificar o papel do enfermeiro na orientação da gestante acerca da violência obstétrica. Metodologia: Pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2017 e 2022. Para seleção dos textos foi realizada uma busca *online* nas Base de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Consideraram-se 06 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Evidenciou-se que o papel do enfermeiro na orientação da gestante acerca da violência obstétrica visa fortalecer o vínculo entre a gestante e o profissional; rastrear doenças e situações de risco; promover ações educativas; oferecer cuidados, com apoio físico e emocional e; proporcionar a escuta ativa. Conclusão: Cabe ao enfermeiro modernizar-se e humanizar-se, refletindo suas qualidades em suas ações e protegendo a dignidade da mulher de qualquer tratamento antinatural, garantido pela Política Nacional de Humanização do Pré-Natal, Parto e Puerpério. Com isso, reconhece-se o protagonismo da mulher e valoriza-se a autonomia e visibilidade do enfermeiro no cuidado à saúde da mulher.

PALAVRAS-CHAVE: violência obstétrica, enfermagem, cuidado pré-natal

ABSTRACT

Motherhood is a period of change for women, whether physical or psychological. Obstetric violence can occur during this period, not limited to the woman, but also to the baby and family members, which can lead to physical, psychological, and sexual damage. Obstetric nursing can help the parturient, making this phase pleasant and respectful, informing, and guiding her physically and psychologically for labor and delivery. Objective: To identify the role of nurses in guiding pregnant women about obstetric violence. Methodology: A descriptive, bibliographic review research, built from materials published between 2017 and 2022. To select the texts, an online search was carried out in the Virtual Health Library Database. We considered 06 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: It was evident that the role of nurses in guiding pregnant women about obstetric violence aims to strengthen the bond between the pregnant woman and the professional; tracking diseases and risk situations; promote educational actions; offer care, with physical and emotional support and provide active listening. Conclusion: It is up to nurses to modernize and humanize themselves, reflecting their qualities in their actions and protecting the dignity of women from any unnatural treatment, guaranteed by the National Policy for the Humanization of Prenatal, Childbirth and Puerperium. With this, the role of women is recognized and the autonomy and visibility of nurses in women's health care is valued.

KEYWORDS: obstetric violence, nursing, prenatal care

Cuidados paliativos: Assistência de enfermagem ao paciente oncológico adulto

Palliative care: Nursing care for adult cancer patients

Festersen, Luana Jorge^a, Vieira, Rillany Christiana^a, Souza, Robson Adilson de^a, Oliveira, Rosângela Gomes de^a, Barros, Tatiane de Melo^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

Os cuidados paliativos compreendem uma abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes. Apesar de sua onipresença, a maioria dos sintomas experimentados por pacientes com câncer avançado, podem ser tratados de forma eficaz usando abordagens farmacológicas e/ou não farmacológicas; a avaliação e o manejo dos sintomas são, portanto, uma habilidade essencial esperada dos profissionais envolvidos no cuidado de pacientes com câncer. Objetivo: Identificar as ações de enfermagem nos cuidados paliativos em pacientes oncológicos adulto. Metodologia: Pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2016 e 2021. Realizou-se uma busca *online* nas Base de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Consideraram-se 11 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português e inglês. Resultados: Evidenciou-se que as ações de enfermagem nos cuidados paliativos em pacientes oncológicos adulto envolvem: manter a melhor qualidade de vida possível; ter intenso pensamento crítico e a capacidade de utilizá-lo em complexas habilidades; atuar com as doenças, mas também com as necessidades físicas, psicossociais, emocionais e espirituais de pacientes gravemente doentes; realizar intervenções individualizadas para melhorar o bem-estar físico e psicológico das pessoas com câncer. Conclusão: Os cuidados paliativos têm como finalidade a otimização da qualidade de vida tanto do paciente com doença grave quanto da sua família. Utilizando-se de medidas especiais e atendendo o paciente com uma abordagem holística pode-se prevenir o sofrimento, aliviar a dor e dar assistência direta ao seu bem-estar.

PALAVRAS-CHAVE: cuidados paliativos, câncer, assistência de enfermagem, oncologia

ABSTRACT

Palliative care comprises an approach that improves patients' quality of life. Despite its ubiquity, most symptoms experienced by patients with advanced cancer can be effectively treated using pharmacological and/or non-pharmacological approaches; Symptom assessment and management is therefore an essential skill expected of professionals involved in the care of cancer patients. Objective: To identify nursing actions in palliative care in adult cancer patients. Methodology: A descriptive, bibliographic review, built from materials published between 2016 and 2021. An online search was carried out in the Virtual Health Library Database. We considered 11 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese and English. Results: It was evidenced that nursing actions in palliative care for adult cancer patients involve maintaining the best possible quality of life; have intense critical thinking and the ability to use it in complex skills; working with illnesses, but also with the physical, psychosocial, emotional, and spiritual needs of seriously ill patients; perform individualized interventions to improve the physical and psychological well-being of people with cancer. Conclusion: Palliative care is aimed at optimizing the quality of life of both the patient with serious illness and their family. Using special measures and treating the patient with a holistic approach, it is possible to prevent suffering, relieve pain and provide direct assistance to their well-being.

KEYWORDS: palliative care, cancer, nursing care, oncology

A participação da enfermagem na prevenção de eventos adversos e na segurança do paciente

Nursing participation in the prevention of adverse events and patient safety

Moraes, Márcia Danuza^a, Cavalcante, Nazinha Paes^a, Vasconcelos, Paula Cristina Teixeira^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

Nos serviços de saúde, as possibilidades de ocorrência de erros são inúmeras e variadas, e os incidentes preveníveis persistem causando milhões de lesões em todo o mundo a cada ano. Objetivo: Conhecer a participação da enfermagem na prevenção de eventos adversos e na segurança do paciente. Metodologia: Pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2016 e 2021. Realizou-se uma busca *online* nas Base de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Consideraram-se 11 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: A participação da enfermagem na prevenção de eventos adversos e na segurança do paciente é representada pela responsabilidade profissional dos enfermeiros e profissionais de saúde em melhorar os resultados dos pacientes, a qualidade do atendimento e, prevenir eventos adversos; por alcançar, por meio do trabalho em equipe, o cuidado e segurança do paciente; pelo elo fundamental que os enfermeiros representam entre pacientes e outros profissionais de saúde e suas atitudes em relação às práticas de segurança, pelo papel fundamental da enfermagem nos serviços de saúde criando um benefício compartilhado para os usuários, dentre outros. Conclusão: A segurança do paciente está altamente ligada às atitudes dos profissionais de saúde e atitudes mais positivas alcançam maiores graus de segurança do paciente. Para garantir a segurança os sistemas de saúde devem fornecer um ambiente livre de lesões acidentais, estabelecer sistemas operacionais, e procedimentos que minimizem a chance de erros e maximizem a probabilidade de interceptá-los antes que ocorram.

PALAVRAS-CHAVE: segurança do paciente, enfermagem, eventos adversos

ABSTRACT

In health services, the possibilities for errors to occur are numerous and varied, and preventable incidents persist causing millions of injuries worldwide each year. Objective: To know the participation of nursing in the prevention of adverse events and patient safety. Methodology: A descriptive, bibliographic review, built from materials published between 2016 and 2021. An online search was carried out in the Virtual Health Library Database. We considered 11 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: Nursing participation in the prevention of adverse events and patient safety is represented by the professional responsibility of nurses and health professionals to improve patient outcomes, quality of care and prevent adverse events; for achieving, through teamwork, patient care and safety; for the fundamental link that nurses represent between patients and other health professionals and their attitudes towards safety practices, for the fundamental role of nursing in health services, creating a shared benefit for users, among others. Conclusion: Patient safety is highly linked to the attitudes of health professionals and more positive attitudes achieve greater degrees of patient safety. To ensure safety, healthcare systems must provide an environment free from accidental injury, establish operating systems, and procedures that minimize the chance of errors and maximize the likelihood of intercepting them before they occur.

KEYWORDS: patient safety, nursing, adverse events

A violência obstétrica no Brasil relacionada ao racismo e às questões de classe social

Obstetric violence in Brazil related to racism and social class issues

Lima, Cláudia Bezerra Gomes de^a, Robis, Karolyne Dias^a, Gonzalez, Monica Nogueira Lorenzo^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

A violência obstétrica (VO) é um termo utilizado para definir todo e qualquer ato de violência à mulher desde a gestação até o parto. Observamos que as mulheres negras são as mais atingidas pelo conjunto do racismo e sexismo existentes, o que não torna o período gestacional, parto e puerpério diferente para elas. A discussão sobre a situação da VO no Brasil atrelada ao racismo, às questões de classe social e desigualdades se faz necessária para a criação da relação entre profissional da saúde e usuárias do serviço de saúde. Objetivo: Identificar a situação da violência obstétrica no Brasil atrelada ao racismo e às questões de classe social. Metodologia: Pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2015 e 2020. Realizou-se uma busca *online* nas Base de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Consideraram-se 11 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Para apresentação dos resultados sobre a situação da violência obstétrica no Brasil atrelada ao racismo e às questões de classe social utilizou-se 3 categorias temáticas, sendo: (1) Racismo e discriminação racial em saúde; (2) Acesso das mulheres negras à saúde reprodutiva e: (3) Aborto inseguro e mortalidade materna. Conclusão: As mulheres negras sofrem maiores violências quando comparadas a outros grupos, pois são vistas num lugar de inferiorização, subalternidade e exotização. Enquanto questões de gênero e raça não forem abordadas e discutidas nos serviços de saúde, muitas pessoas, especialmente mulheres negras, não serão atendidas com dignidade e respeito.

PALAVRAS-CHAVE: mulheres negras, violência obstétrica, racismo

ABSTRACT

Obstetric violence (VO) is a term used to define all acts of violence against women from pregnancy to childbirth. We observed that black women are the most affected by the set of existing racism and sexism, which does not make the gestational period, childbirth, and puerperium different for them. The discussion about the situation of VO in Brazil linked to racism, social class issues and inequalities is necessary for the creation of the relationship between health professionals and health service users. Objective: To identify the situation of obstetric violence in Brazil linked to racism and social class issues. Methodology: A descriptive, bibliographic review, built from materials published between 2015 and 2020. An online search was carried out in the Virtual Health Library Database. We considered 11 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: To present the results about obstetric violence in Brazil linked to racism and social class issues, 3 thematic categories were used, namely: (1) Racism and racial discrimination in health; (2) Black women's access to reproductive health and: (3) Unsafe abortion and maternal mortality. Conclusion: Black women suffer greater violence when compared to other groups, as they are seen in a place of inferiority, subalternity and exoticization. Until gender and race issues are addressed and discussed in health services, many people, especially black women, will not be treated with dignity and respect.

KEYWORDS: black women, obstetric violence, racism

Fatores associados ao tratamento em gestantes portadoras de sífilis

Factors associated with treatment in pregnant women with syphilis

Santos, Jamile Magalhães dos^a, Floriano, Jéssica Monique^a, Santos, Jussara de Andrade^a, Macedo, Larissa Maeli^a, Lima, Viviane Schlobach^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

A Sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, que existe há décadas e, com números cada vez mais preocupantes. Em gestantes, o número de casos notificados de mortes fetais cresce desmesuradamente a cada ano apesar de medidas preventivas no pré-natal, informações e tratamento disponível no âmbito do Sistema Único de Saúde. Em 2011, o Ministério da Saúde disponibilizou testes rápidos para gestantes e seus parceiros visando o diagnóstico e início do tratamento precoce para evitar a transmissão vertical para o feto. Objetivo: Identificar os fatores associados ao tratamento em gestantes portadoras de sífilis. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2015 e 2020. Para seleção dos textos foi realizada uma busca online nas Base de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Consideraram-se 12 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. As PALAVRAS-CHAVE investigadas foram: Sífilis; Gestantes; Terapêutica. Resultados: Para apresentação dos resultados sobre os fatores associados ao tratamento em gestantes portadoras de sífilis utilizou-se 04 categorias temáticas, sendo: (1) Realizar Diagnóstico precoce de sífilis na gestante durante o pré-natal; (2) Notificar casos de sífilis em gestantes; (3) Reverter a baixa adesão ao tratamento; (4) Orientar para a prevenção de sífilis em gestantes. Conclusão: A falta de conhecimento e orientações sobre o diagnóstico, tratamento e o manejo da Sífilis impacta nos elevados números de gestantes portadoras de sífilis. O tratamento evita a transmissão vertical, considerando que todos os processos devem ser realizados com qualidade e tempo para que se conclua de maneira benéfica para o feto.

PALAVRAS-CHAVE: sífilis, gestante, terapêutica

ABSTRACT

Syphilis is a sexually transmitted infection that has been around for decades and with increasingly worrying numbers. In pregnant women, the number of reported cases of fetal deaths grows disproportionately every year despite preventive measures in prenatal care, information, and treatment available within the scope of the Unified Health System. In 2011, the Ministry of Health made rapid tests available to pregnant women and their partners for early diagnosis and initiation of treatment to prevent vertical transmission to the fetus. Objective: To identify factors associated with treatment in pregnant women with syphilis. Methodology: This is a descriptive literature review, built from materials published between 2015 and 2020. To select the texts, an online search was carried out in the Virtual Health Library Database. We considered 12 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. The KEYWORDS investigated were Syphilis; pregnant women; Therapy. Results: To present the results on factors associated with treatment in pregnant women with syphilis, 04 thematic categories were used, as follows: (1) Perform early diagnosis of syphilis in pregnant women during prenatal care; (2) Report cases of syphilis in pregnant women; (3) Reverse low adherence to treatment; (4) Guide for the prevention of syphilis in pregnant women. Conclusion: The lack of knowledge and guidance on the diagnosis, treatment and management of syphilis impacts the high numbers of pregnant women with syphilis. The treatment avoids vertical transmission, considering that all processes must be carried out with quality and time so that it is concluded in a beneficial way for the fetus.

KEYWORDS: syphilis, pregnant woman, therapeutics

Aspectos relacionados a prevenção da pneumonia associada a ventilação mecânica em pacientes críticos

Aspects related to the prevention of ventilator-associated pneumonia in critically ill patients

Pereira, Elisabete de Lima^a, Ponciano, Erik Henrique Barreto^a, Oliveira, Estella Weigl Marinho de^a, Silva, Fabiana Maris da^a, Souza, Fabiane Evol Cavalcante de^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

A pneumonia associada à ventilação (PAV) é uma infecção que surge entre 48 e 72 horas após a intubação traqueal e início da ventilação mecânica invasiva (VMI) ou, até 48 horas após a retirada do tubo, atingindo de 10 a 40% dos pacientes. A PAV é um problema de saúde pública, gerando custos adicionais ao hospital em razão do prolongamento da internação com alta taxa de mortalidade, deste modo, a equipe multiprofissional é fundamental para a prevenção dessa complicação hospitalar. Objetivo: Identificar os aspectos relacionados a prevenção da pneumonia associada a ventilação mecânica em pacientes críticos. Metodologia: Pesquisa de revisão bibliográfica, construída a partir de materiais publicados entre 2015 e 2021. Para seleção dos textos foi feito um levantamento na *internet*, utilizando as bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Consideraram-se 08 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Para apresentação dos resultados sobre os aspectos relacionados a prevenção da pneumonia associada a ventilação mecânica, utilizou-se 04 categorias temáticas, sendo: (1) Reconhecimento dos profissionais sobre a importância da prevenção da PAV; (2) Técnicas e impactos da adesão aos procedimentos de prevenção de PAV (3) Dificuldades a Adesão dos Procedimentos de Prevenção a PAV; (4) Soluções utilizadas na higiene oral para prevenção da PAV. Conclusão: A pneumonia associada à ventilação mecânica tem uma elevada frequência nas Unidades de Terapia Intensiva em diversos hospitais do país. A revisão mostra que a adoção de medidas preventivas apresenta um impacto positivo na diminuição da ocorrência desta infecção em unidades críticas.

PALAVRAS-CHAVE: pneumonia associada a ventilação mecânica, assistência de enfermagem, intervenções de enfermagem, atuação do enfermeiro

ABSTRACT

Ventilator-associated pneumonia (PAV) is an infection that appears between 48 and 72 hours after tracheal intubation and initiation of invasive mechanical ventilation (VMI) or, up to 48 hours after tube removal, affecting 10 to 40% of patients. PAV is a public health problem, generating additional costs to the hospital due to prolonged hospitalization with a high mortality rate, thus, the multidisciplinary team is essential for the prevention of this hospital complication. Objective: To identify aspects related to the prevention of ventilator-associated pneumonia in critically ill patients. Methodology: Bibliographic review research, built from materials published between 2015 and 2021. To select the texts, a survey was carried out on the internet, using the databases of the Virtual Health Library. We considered 08 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: To present the results on aspects related to the prevention of ventilator-associated pneumonia, 04 thematic categories were used, as follows: (1) Professionals' recognition of the importance of PAV prevention; (2) Techniques and impacts of adherence to PAV prevention procedures (3) Difficulties in Adhering to PAV Prevention Procedures; (4) Solutions used in oral hygiene to prevent PAV. Conclusion: Pneumonia associated with mechanical ventilation has a high frequency in Intensive Care Units in several hospitals in the country. The review shows that the adoption of preventive measures has a positive impact on reducing the occurrence of this infection in critical units.

KEYWORDS: pneumonia associated with mechanical ventilation, nursing care, nursing interventions, nurse performance

Fatores relacionados a higienização das mãos ou a falta dela pela equipe de saúde no ambiente hospitalar

Factors related to hand hygiene or the lack of it by the health team in the hospital environment

Gonçalves, Alexandra dos Santos^a, Silva, Maria da Conceição Miranda da^a, Oliveira, Paula dos Santos^a, Cruz, Rafael Oliveira da^a, Braga, Teresa^b, Pinho, Maria Carla Vieira^c

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Preceptor de Estágio do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

c. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

As mãos são consideradas as principais vias de transmissão de microrganismos e veículos que os conduzem de um indivíduo para o outro, sendo a higienização das mãos uma das principais práticas, e meio de prevenção no controle de infecções. No ambiente hospitalar é reconhecida mundialmente como medida primária de suma importância no controle de infecções relacionadas à assistência à saúde. Objetivo: Conhecer os fatores relacionados a higienização das mãos ou a falta dela pela equipe de saúde no ambiente hospitalar. Metodologia: Pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2015 e 2021. Realizou-se uma busca *online* nas Base de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Consideraram-se 11 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Os fatores relacionados a higienização das mãos ou a falta dela pela equipe de saúde no ambiente hospitalar envolve: conhecimento técnico-científico sobre a lavagem das mãos, responsabilidade dos profissionais de saúde no ambiente hospitalar, práticas de educação continuada em saúde. Conclusão: Intervenções educacionais devem fornecer evidências claras de que as mãos dos profissionais de saúde, se tornam grosseiramente contaminadas com patógenos após o contato com o paciente, e que a sua higienização é o meio mais fácil e eficaz de descontaminá-las e, assim, reduzir as taxas de infecção. Dar ênfase e aumentar a responsabilidade do controle de infecção aos membros das organizações, mudar o paradigma da vigilância para monitoramento contínuo e emitir *feedback* eficazes de dados são algumas medidas importantes que precisam ser adotadas no ambiente hospitalar.

PALAVRAS-CHAVE: higienização das mãos, enfermagem, educação continuada, assepsia

ABSTRACT

Hands are considered the main routes of transmission of microorganisms and vehicles that carry them from one individual to another, and hand hygiene is one of the main practices, and a means of prevention in the control of infections. In the hospital environment, it is recognized worldwide as a primary measure of paramount importance in the control of infections related to health care. Objective: To know the factors related to hand hygiene or the lack of it by the health team in the hospital environment. Methodology: A descriptive, bibliographic review, built from materials published between 2015 and 2021. An online search was carried out in the Virtual Health Library Database. We considered 11 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: Factors related to hand hygiene or the lack of it by the health team in the hospital environment involve technical-scientific knowledge about hand washing, responsibility of health professionals in the hospital environment, continuing health education practices. Conclusion: Educational interventions should provide clear evidence that healthcare workers' hands become grossly contaminated with pathogens after patient contact, and that hand hygiene is the easiest and most effective means of decontaminating them and thus, reduce infection rates. Emphasizing and increasing responsibility for infection control to members of organizations, shifting the surveillance paradigm to continuous monitoring and issuing effective data feedback are some important measures that need to be adopted in the hospital environment.

KEYWORDS: hand hygiene, nursing, continuing education, asepsis

A importância da atuação do enfermeiro nos cuidados de enfermagem ao paciente traqueostomizado na Unidade de Terapia Intensiva

The importance of nurses' performance in nursing care for tracheostomized patients in the Intensive Care Unit

Oliveira, Maria Cleusa de^a, Lima, Fernando Guedes de^a, Moraes, Wanderson Luis de^a, Cavalcante, Maria Lucielda Barbosa^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

A traqueostomia é um procedimento cirúrgico que proporciona a comunicação entre a traqueia e o meio externo. É indicada quando há obstrução das vias aéreas superiores, sendo um dos procedimentos mais realizados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e requer cuidados específicos. Objetivo: Reconhecer a importância da atuação do enfermeiro nos cuidados de enfermagem ao paciente traqueostomizado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Metodologia: Pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2012 e 2022. Realizou-se uma busca *online* nas Base de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde, *Scientific Electronic Library Online*, e *sites* de relevância para o tema. Consideraram-se 4 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Os cuidados de enfermagem ao paciente traqueostomizado em UTI envolvem: a realização da Sistematização de Assistência de Enfermagem adequada, respeitando as particularidades do paciente e contribuindo para um desfecho positivo; seguimento de protocolos e realização de treinamentos com objetivo de minimizar os riscos e maximizar os ganhos nos cuidados prestados; redução de complicações no quadro clínico do paciente entendendo a sua complexidade, monitorando os procedimentos de limpeza ou assepsia e verificando a presença de secreções, posicionamento da cânula e a postura do paciente no leito. Conclusão: O diálogo entre os profissionais de saúde e o incentivo ao estudo de técnicas para a melhoria do cuidado e atendimento dos pacientes traqueostomizados devem ser contínuos, uma vez que são essenciais para a prevenção das complicações e diminuição dos casos de óbitos nas UTI.

PALAVRAS-CHAVE: traqueostomia, cuidados de enfermagem, UTI

ABSTRACT

Tracheostomy is a surgical procedure that provides communication between the trachea and the external environment. It is indicated when there is obstruction of the upper airways, being one of the most performed procedures in Intensive Care Units (UTI) and requires specific care. Objective: To recognize the importance of the nurse's role in nursing care for tracheostomized patients in the Intensive Care Unit (UTI). Methodology: A descriptive, bibliographic review, built from materials published between 2012 and 2022. An online search was carried out in the Virtual Health Library Database, Scientific Electronic Library Online, and websites of relevance to the topic. We considered 4 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: Nursing care for tracheostomized patients in the UTI involves: carrying out an adequate Systematization of Nursing Care, respecting the patient's particularities and contributing to a positive outcome; following protocols and conducting training in order to minimize risks and maximize gains in the care provided; reduction of complications in the patient's clinical condition by understanding its complexity, monitoring cleaning or asepsis procedures and verifying the presence of secretions, positioning of the cannula and the patient's posture in bed. Conclusion: The dialogue between health professionals and the encouragement of the study of techniques to improve the care and care of tracheostomized patients must be continuous since they are essential for the prevention of complications and the reduction of cases of deaths in the UTI.

KEYWORDS: tracheostomy, nursing care, UTI

Atuação do enfermeiro como educador em saúde para prevenção de sífilis na população idosa

Nurse's role as a health educator for the prevention of syphilis in the elderly population

Santos, Bruna Oliveira dos^a, Sampaio, Jefferson Ferreira^a, Jesus, Monick Victoria Alves de^a, Silva, Sandro de Oliveira^a, Alves, Valdirene Sousa^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), no ano de 2002 em todo o Mundo a soma de idosos era de 590 milhões, número que conforme previsão ultrapasse 1,2 bilhão, em 2025. Dentre os idosos, 13% das mulheres e 18% dos homens não utilizam o preservativo em suas práticas sexuais, sendo esta uma das medidas mais eficientes na prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), inclusive a sífilis, causada pela bactéria *Treponema pallidum*. Neste sentido, as práticas educacionais conferidas pelo enfermeiro podem contribuir para a qualificação de prevenção das IST e para a promoção da saúde da população idosa. Objetivo: Descrever a atuação do Enfermeiro como educador em saúde para a prevenção de sífilis na população idosa. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, descritiva, realizada eletronicamente, construída a partir de materiais publicados entre 2016 e 2022. Realizou-se uma busca nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde, utilizando-se 18 publicações. Resultados: Para apresentação dos resultados sobre a atuação do enfermeiro como educador em saúde para a prevenção de sífilis na população idosa utilizou-se 03 categorias temáticas, sendo: Entendimento sobre envelhecimento e a sexualidade; Conhecimento técnico-científico da Infecção Sexualmente Transmissível: Sífilis e; O papel do enfermeiro como educador em saúde para a prevenção de sífilis na população idosa. Conclusão: O Enfermeiro deve atuar de forma contínua nas políticas de promoção da saúde, utilizando de várias possibilidades de abordagem, considerando aspectos psicossociais e culturais em que os indivíduos estão inseridos, propiciando a qualidade na assistência.

PALAVRAS-CHAVE: política pública de saúde, sífilis, saúde sexual, envelhecimento, *Treponema pallidum*

ABSTRACT

According to the World Health Organization (WHO), in 2002, the number of elderly people worldwide was 590 million, a number that is predicted to exceed 1.2 billion in 2025. Among the elderly, 13% of women and 18% of men do not use condoms in their sexual practices, which is one of the most efficient measures in the prevention of Sexually Transmitted Infections (STIs), including syphilis, caused by the bacterium *Treponema pallidum*. In this sense, the educational practices provided by nurses can contribute to the qualification of IST prevention and to the health promotion of the elderly population. Objective: To describe the role of the Nurse as a health educator for the prevention of syphilis in the elderly population. Methodology: This is a bibliographic, descriptive research, carried out electronically, built from materials published between 2016 and 2022. A search was carried out in the Virtual Health Library databases, using 18 publications. Results: To present the results on the role of nurses as health educators for the prevention of syphilis in the elderly population, 03 thematic categories were used, as follows: Understanding of aging and sexuality; Technical-scientific knowledge of Sexually Transmitted Infection: Syphilis and the role of the nurse as a health educator for the prevention of syphilis in the elderly population. Conclusion: Nurses must act continuously in health promotion policies, using several possibilities of approach, considering psychosocial and cultural aspects in which individuals are inserted, providing quality care.

KEYWORDS: public health policy, syphilis, sexual health, Aging, *Treponema pallidum*

Variáveis familiares e multifatoriais que interferem nas doenças relacionadas ao uso de álcool e drogas e as possibilidades de tratamento

Family and multifactorial variables that interfere in diseases related to alcohol and drug use and treatment possibilities

Santos, Amanda Priscila Ballan dos^a, Vicente, Andréia Cristina de Oliveira^a, Jesus, Elaine Bernardo de^a, Silva, Francisca Adriana Santana da^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

Em geral, a população sofre com transtornos mentais severos, persistentes ou graves, muitos deles decorrentes do uso de álcool ou outras drogas, e assim, necessita de atendimento em saúde mental contínuo ou eventual. Dados apontam que o ambiente familiar é um dos fatores que maior ampliam o início ao seu consumo, portanto, gestores e profissionais devem se unir para promover a atenção psicossocial. Objetivo: Reconhecer as variáveis familiares e multifatoriais que interferem nas doenças relacionadas ao uso de álcool e drogas e as possibilidades de tratamento. Metodologia: Realizou-se uma pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2005 e 2021. Realizou-se uma busca *online* nas Base de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Consideraram-se 17 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Para apresentação dos resultados sobre as variáveis familiares e multifatoriais que interferem nas doenças relacionadas ao uso de álcool e drogas e as possibilidades de tratamento utilizou-se 02 categorias temáticas, sendo: (1) As variáveis familiares e multifatoriais e; (2) Possibilidades de tratamento aos usuários de álcool e drogas. Conclusão: Compreende-se que ambiente familiar é a base de formação para os indivíduos, portanto, a sua desestruturação, instabilidade social, problemas psicológicos, observação e repetição de comportamentos e, problemas emocionais interferem nas doenças relacionadas ao uso de álcool e drogas. Assim é essencial que a rede psicossocial esteja preparada para responder às diferentes necessidades.

PALAVRAS-CHAVE: atenção psicossocial, pacientes usuários de álcool e drogas, enfermagem, cuidados aos usuários de drogas e álcool

ABSTRACT

In general, the population suffers from severe, persistent, or severe mental disorders, many of them resulting from the use of alcohol or other drugs, and thus, need continuous or occasional mental health care. Data indicate that the family environment is one of the factors that increase the beginning of its consumption, therefore, managers and professionals must come together to promote psychosocial care. Objective: To recognize the family and multifactorial variables that interfere in diseases related to the use of alcohol and drugs and the possibilities of treatment. Methodology: A descriptive bibliographic review research was carried out, built from materials published between 2005 and 2021. An online search was carried out in the Virtual Health Library Database. We considered 17 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: To present the results on family and multifactorial variables that interfere in diseases related to alcohol and drug use and treatment possibilities, 02 thematic categories were used, as follows: (1) Family and multifactorial variables and (2) Treatment possibilities for alcohol and drug users. Conclusion: It is understood that the family environment is the basis of training for individuals, therefore, its disruption, social instability, psychological problems, observation and repetition of behaviors and emotional problems interfere with diseases related to the use of alcohol and drugs. Thus, it is essential that the psychosocial network is prepared to respond to different needs.

KEYWORDS: psychosocial care, patients using alcohol and drugs, nursing, care for drug and alcohol users

Os impactos da Síndrome de *Burnout* na qualidade de vida dos profissionais de enfermagem

The impacts of Burnout Syndrome on the quality of life of nursing professionals

Ventura, Ana Paula^a, Santos, Fabiana Assis dos^a, Souza, Silene Andrade Siqueira^a, Souza, Sueli Ferreira Barros de^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

O termo *Burnout* tem origem inglesa, cujo significado é “queima após desgaste”. No Brasil, ela foi descrita pela primeira vez em 1987, e estudos sobre ela ganharam destaque e expansão principalmente após a pandemia COVID-19, em 2020. A Síndrome de *Burnout* é um distúrbio emocional com sintomas físicos e mentais como, por exemplo, exaustão extrema, estresse e esgotamento causado por situações de trabalho desgastantes. Objetivo: Identificar os impactos da Síndrome de *Burnout* na qualidade de vida dos profissionais de enfermagem. Metodologia: Pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2017 e 2022. Consideraram-se 13 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, nos idiomas português e espanhol. Resultados: Para apresentação dos resultados sobre os impactos da Síndrome de *Burnout* na qualidade de vida dos profissionais de enfermagem utilizou-se 05 categorias temáticas, sendo: (1) Perfil dos profissionais da saúde com Síndrome de *Burnout*; (2) Busca de estratégias de enfrentamento da Síndrome de *Burnout*; (3) Consequências e percepções da Síndrome de *Burnout* na enfermagem; (4) Fatores de risco para Síndrome de *Burnout* dentre os profissionais da enfermagem e; (5) Intensidade da Síndrome de *Burnout* na enfermagem de acordo com a área de atuação. Conclusão: Os estudos se concentram nas estratégias de enfrentamento, consequências, percepções, fatores de risco e intensidade da Síndrome de *Burnout*, mas não há destaque quanto a preocupação e ao cuidado físico e mental dos profissionais de enfermagem, e esses profissionais, especialmente fragilizados, necessitam de maior atenção e reconhecimento em suas vidas fora do ambiente laboral.

PALAVRAS-CHAVE: *Burnout*, profissionais da enfermagem, saúde mental

ABSTRACT

The term Burnout is of English origin, meaning “burning after wear and tear”. In Brazil, it was first described in 1987, and studies on it gained prominence and expansion, especially after the COVID-19 pandemic, in 2020. Burnout Syndrome is an emotional disorder with physical and mental symptoms, such as exhaustion, extreme stress and burnout caused by stressful work situations. Objective: To identify the impacts of Burnout Syndrome on the quality of life of nursing professionals. Methodology: A descriptive, bibliographic review research, built from materials published between 2017 and 2022. Thirteen publications were considered that met the study theme, published in full, with full texts available, in Portuguese and Spanish. Results: To present the results on the impacts of Burnout Syndrome on the quality of life of nursing professionals, 05 thematic categories were used, as follows: (1) Profile of health professionals with Burnout Syndrome; (2) Search for coping strategies for Burnout Syndrome; (3) Consequences and perceptions of Burnout Syndrome in nursing; (4) Risk factors for Burnout Syndrome among nursing professionals and; (5) Intensity of Burnout Syndrome in nursing according to the area of activity. Conclusion: The studies focus on coping strategies, consequences, perceptions, risk factors and intensity of Burnout Syndrome, but there is no emphasis on the concern and physical and mental care of nursing professionals, and these professionals, especially fragile, need more attention and recognition in their lives outside the work environment.

KEYWORDS: burnout, nursing professionals, mental health

O papel do enfermeiro frente ao uso cateter central de hemodiálise

The nurse's role in the use of a central hemodialysis catheter

Oliveira, Bianca Maria Avanci de^a, Macena, Nayran Beatriz^a, Lima, Vivian Suellen Braga de^a, Hirano, Gisele Saraiva^b, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

A doença Renal Crônica (DRC) é definida pela presença da lesão renal ou diminuição da filtração glomerular que progride de forma lenta e contínua; o número de indivíduos portadores de DRC que necessitam de hemodiálise vem crescendo no mundo todo. A hemodiálise pode ser feita através da Fístula Arteriovenosa (FAV) ou Cateter Venoso Central (CVC) de curta e longa permanência. As infecções de corrente sanguínea associadas ao CVC estão extremamente ligadas aos principais cuidados prestados aos pacientes, possibilitando prevenções pela enfermagem. Objetivo: Identificar o papel do enfermeiro frente ao uso do cateter central de hemodiálise. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2017 e 2021. Para seleção dos textos foi realizada uma busca *online* nas Base de Dados Biblioteca Virtual em Saúde. Consideraram-se 14 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Para apresentação dos resultados sobre o papel do enfermeiro na prevenção de infecção de cateter central de hemodiálise utilizou-se 4 categorias temáticas, sendo: (1) Prevenção de Infecção; (2) Intervenção de Enfermagem; (3) Cuidados de Enfermagem - Ação Educativa; (4) Eventos Adversos. Conclusão: Em virtude dos fatos mencionados, pode-se observar uma grande porcentagem de infecções da corrente sanguínea nos pacientes que utilizam CVC, considerando ainda seu tempo de permanência e um pouco maior, caso o paciente esteja em uma unidade de terapia intensiva, tendo em risco o fator de mortalidade.

PALAVRAS-CHAVE: cateter, enfermagem, hemodiálise

ABSTRACT

Chronic Kidney Disease (CKD) is defined by the presence of kidney damage or decreased glomerular filtration that progresses slowly and continuously; the number of individuals with CKD requiring hemodialysis has been increasing worldwide. Hemodialysis can be done through Arteriovenous Fistula (FAV) or short- and long-term Central Venous Catheter (CVC). Bloodstream infections associated with CVC are extremely linked to the main care provided to patients, enabling nursing prevention. Objective: To identify the role of nurses regarding the use of central hemodialysis catheters. Methodology: This is a descriptive bibliographic review, built from materials published between 2017 and 2021. To select the texts, an online search was carried out in the Database Virtual Health Library. We considered 14 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: To present the results on the role of nurses in the prevention of central hemodialysis catheter infection, 4 thematic categories were used, namely: (1) Infection Prevention; (2) Nursing Intervention; (3) Nursing Care - Educational Action; (4) Adverse Events. Conclusion: Due to the facts, a large percentage of bloodstream infections can be observed in patients using CVC, considering their length of stay and a little longer if the patient is in an intensive care unit, considering risk the mortality factor.

KEYWORDS: catheter, nursing, hemodialysis

Intervenções de enfermagem na depressão durante a adolescência

Nursing interventions in depression during adolescence

Dias, Alessandra de Almeida^a, Silva, Débora Sobral da^a, Soares, Douglas Luciano Arruda^a, Pinheiro, Ingridy Tamires de Souza^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU
b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

A tristeza é uma emoção natural e inerente do ser humano, mas na adolescência, por ser um período da vida marcada por mudanças biopsicossocioemocionais, o sentimento de tristeza profunda pode ser persistente, indicando a depressão. Assim, a enfermagem pode proporcionar ações e se qualificar para ajudar o adolescente a transcorrer por essa fase de intensas emoções e transformações. Objetivo: Constatar as intervenções da enfermagem na depressão durante a adolescência. Metodologia: Refere-se a uma pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2016 e 2021. Realizou-se uma busca *online* nas Base de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Consideraram-se 10 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português e inglês. Resultados: Dentre as intervenções de enfermagem na depressão durante a adolescência estão: Promoção da saúde mental de jovens e adultos; Técnicas de hipnose agregadas a terapias cognitivas; Realização de ações na atenção primária a pacientes com transtornos mentais e; Treinamento da equipe de enfermagem para lidar com pacientes com transtornos mentais. Conclusão: Além de oferecer um atendimento humanizado, livre de julgamentos, críticas e comentários irrelevantes, a equipe de enfermagem necessita de cautela, empatia e policiamento com as palavras e atitudes, visto que o adolescente com diagnóstico de depressão encontra-se com suas emoções, pensamentos e ações prejudicadas. A prevenção e o acompanhamento de casos de depressão durante a adolescência podem diminuir os comportamentos suicidas e evitar que a situação se torne crônica na fase adulta.

PALAVRAS-CHAVE: depressão, enfermagem, adolescentes

ABSTRACT

Sadness is a natural and inherent emotion of the human being, but in adolescence, as it is a period of life marked by biopsychosocial-emotional changes, the feeling of deep sadness can be persistent, indicating depression. Thus, nursing can provide actions and be qualified to help the adolescent to go through this phase of intense emotions and transformations. Objective: To verify nursing interventions in depression during adolescence. Methodology: Refers to a descriptive, bibliographic review research, built from materials published between 2016 and 2021. An online search was carried out in the Virtual Health Library Database. We considered 10 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese and English. Results: Among the nursing interventions for depression during adolescence are Promotion of mental health in young people and adults; Hypnosis techniques added to cognitive therapies; Carrying out actions in primary care for patients with mental disorders and Training of the nursing staff to deal with patients with mental disorders. Conclusion: In addition to offering humanized care, free from judgments, criticisms and irrelevant comments, the nursing team needs caution, empathy and policing with words and attitudes, since adolescents diagnosed with depression are faced with their emotions, impaired thoughts, and actions. The prevention and monitoring of cases of depression during adolescence can reduce suicidal behavior and prevent the situation from becoming chronic in adulthood.

KEYWORDS: depression, nursing, adolescents

Usuárias de *crack*: a importância da assistência de enfermagem

Crack users: the importance of nursing care

Farias, Andreza dos Santos^a, Souza, Elisângela Aparecida Brandão de^a, Souza, Larissa Gabrielle de^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

O consumo de *crack* é uma problemática universal e, portanto, não é diferente para a saúde pública brasileira. Ao longo dos anos houve mudanças de gênero com relação ao uso excessivo de *crack*, configurando-se um elemento devastador para a figura feminina, pois interfere em aspectos morais e sociais, onde o preconceito diminui as chances de adesão ao tratamento. Assim, a assistência de enfermagem à mulher em condições de dependência se tornou um assunto importante. Objetivo: Descrever a importância da assistência de enfermagem às mulheres usuária de *crack*. Metodologia: Pesquisa de revisão bibliográfica, com levantamento de dados a partir das principais publicações científicas produzidas entre 2005 e 2021. Para o levantamento bibliográfico, foram utilizados os bancos de dados Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e SciELO (*Scientific Electronic Library Online*). Selecionaram-se 16 artigos. Como critério de inclusão para a realização da pesquisa, consideraram-se os materiais publicados em língua portuguesa, escritos por enfermeiros e os que atendiam ao objetivo proposto pelo estudo. Resultados: Para apresentação dos resultados sobre a importância da assistência de enfermagem às mulheres usuária de *crack* utilizou-se 03 categorias temáticas, sendo: (1) O impacto histórico do *crack* na sociedade; (2) O perfil do usuário de *crack*; (3) Assistência de enfermagem às usuárias de *crack*. Conclusão: O preconceito em torno das usuárias de *crack* está na sociedade e na própria usuária, por isso, é de extremo interesse a conscientização dos profissionais da saúde e da sociedade sobre a importância da ressocialização das usuárias de *crack*, do acolhimento e da redução de danos para reabilitação da dependência.

PALAVRAS-CHAVE: Usuárias de crack, Ressocialização, Assistência de enfermagem

ABSTRACT

Crack consumption is a universal problem and, therefore, is no different for Brazilian public health. Over the years, there have been gender changes in relation to excessive use of crack, configuring a devastating element for the female figure, as it interferes with moral and social aspects, where prejudice reduces the chances of adherence to treatment. Thus, nursing care for women in conditions of dependence has become an important issue. Objective: To describe the importance of nursing care for women who use crack. Methodology: Bibliographic review research, with data collection from the main scientific publications produced between 2005 and 2021. For the bibliographic survey, Lilacs (Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences) and SciELO databases were used. (Scientific Electronic Library Online). 16 articles were selected. As inclusion criteria for conducting the research, materials published in Portuguese, written by nurses and those that met the objective proposed by the study were considered. Results: To present the results on the importance of nursing care for women who use crack, 03 thematic categories were used, namely: (1) The historical impact of crack on society; (2) The crack user's profile; (3) Nursing care for crack users. Conclusion: The prejudice around crack users is in society and in the user herself, so it is of extreme interest to raise awareness of health professionals and society about the importance of resocialization of crack users, reception, and reduction of damages for addiction rehabilitation.

KEYWORDS: crack users, resocialization, nursing care

A assistência de enfermagem na prevenção da hemorragia pós-parto

Nursing care in the prevention of postpartum hemorrhage

Cardoso, Caroline Aparecida Ribeiro^a, Gama, Maria do Socorro de Sá^a, Melo, Nathanyell Silva de^a, Silva, Vitória Carolina Melo da^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

Uma das principais causas de mortes maternas no Brasil e no mundo é a hemorragia pós-parto (HPP). Trata-se de perda sanguínea acima de 500 ml após parto vaginal ou acima de 1000 ml após parto cesariana nas primeiras 24 horas ou qualquer perda de sangue pelo trato genital capaz de causar instabilidade hemodinâmica. Esta é uma morte evitável quando as medidas preventivas são realizadas de modo adequado. Objetivo: Identificar como deve ser realizada a assistência de enfermagem na prevenção da hemorragia pós-parto. Metodologia: Pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2017 e 2022. Realizou-se uma busca *online* nas Base de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Consideraram-se 10 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Para apresentação dos resultados optou-se pela descrição das publicações de acordo com a relevância do seu conteúdo. Assim, evidenciou-se que a enfermagem tem papel fundamental na prevenção da HPP desde o acompanhamento da gestante no pré-natal até o puerpério, através da identificação dos fatores de risco, medidas preventivas como o uso profilático de ocitocina e o manejo ativo do terceiro período do trabalho de parto, realização do exame físico, diagnóstico precoce da HPP e abordagem sem atrasos dentro da “hora ouro”. Conclusão: A hemorragia pós-parto pode ser evitada quando o enfermeiro e sua equipe estão preparados para utilizar estratégias que contribuem para sua prevenção, diagnóstico precoce e tratamento eficaz, sendo necessário capacitações profissionais para intensificar conhecimento técnico/científico sobre o tema.

PALAVRAS-CHAVE: hemorragia pós-parto, assistência de enfermagem, puerpério

ABSTRACT

One of the main causes of maternal deaths in Brazil and in the world is postpartum hemorrhage (PPH). Blood loss of more than 500 ml after vaginal delivery or more than 1000 ml after cesarean delivery in the first 24 hours or any blood loss from the genital tract capable of causing hemodynamic instability. This is a preventable death when preventive measures are carried out properly. Objective: To identify how nursing care should be performed in the prevention of postpartum hemorrhage. Methodology: A descriptive, bibliographic review, built from materials published between 2017 and 2022. An online search was carried out in the Virtual Health Library Database. We considered 10 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: For the presentation of the results, the description of the publications was chosen according to the relevance of their content. Thus, it was evidenced that nursing has a fundamental role in the prevention of PPH from the monitoring of the pregnant woman in the prenatal period until the puerperium, through the identification of risk factors, preventive measures such as the prophylactic use of oxytocin and the active management of the third party. period of labor, physical examination, early diagnosis of PPH and approach without delays within the “golden hour”. Conclusion: Postpartum hemorrhage can be avoided when nurses and their staff are prepared to use strategies that contribute to its prevention, early diagnosis, and effective treatment, requiring professional training to intensify technical/scientific knowledge on the subject.

KEYWORDS: postpartum hemorrhage, nursing care, puerperium

Uso de PICC em UTI neonatal: Cuidados e assistência de enfermagem

Use of PICC in neonatal ICU: Nursing care and assistance

Miranda, Ademário Xavier do Nascimento^a, Nascimento, Denise Gonçalves do^a, Lima, Mirley Sandy Pereira da Silva^a, Simões, Paula Cristina da Silva Rozas^a, Sousa, Regiane do Socorro Bento de^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

O Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) possibilita intervenções de maneira segura, eficiente e eficaz, proporcionando maior hemodiluição da terapia intravenosa, controle efetivo das doses administradas e redução dos riscos, oportunizando celeridade e responsividade no suporte vital no ambiente de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), otimizando os processos e as intervenções de enfermagem e, reduzindo custos materiais, infraestruturais e humanos na manutenção do acesso venoso. Objetivo: Compreender os benefícios e os riscos da utilização do Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), destacando o papel do enfermeiro. Metodologia: Pesquisa bibliográfica exploratória, descritiva realizada no período de fevereiro a junho de 2022 utilizando-se as bases de dados da Biblioteca Virtual da Saúde. Foram selecionadas 08 publicações, considerando-se artigos sobre a temática, disponíveis na íntegra, em português e publicados entre 2017 e 2022. Resultados: Destacou-se os riscos e os benefícios do Uso do PICC na UTIN e o papel do Enfermeiro na utilização do PICC na UTIN, como por exemplo, Tomada de decisão, Condução, Monitoramento. Intervenção. Diminuição de agravos e gestão de risco. Conclusão: Os cuidados de enfermagem quanto à utilidade, benefícios e risco do uso do PICC devem estar condicionados ao reconhecimento do perfil típico de paciente, das vulnerabilidades predisponentes e dos fatores de risco intrínsecos, cursando intervenções capazes de qualificar a assistência de enfermagem, promovendo a redução da dor e do desconforto e a humanização do procedimento.

PALAVRAS-CHAVE: PICC, UTIN, neonatal, enfermagem

ABSTRACT

The Peripherally Inserted Central Catheter (PICC) enables interventions in a safe, efficient, and effective way, providing greater hemodilution of intravenous therapy, effective control of administered doses and risk reduction, providing celerity and responsiveness in vital support in the Intensive Care Unit environment. Neonatal (UTIN), optimizing nursing processes and interventions and reducing material, infrastructural and human costs in maintaining venous access. Objective: To understand the benefits and risks of using the Peripherally Inserted Central Catheter (PICC) in the Neonatal Intensive Care Unit (UTIN), highlighting the role of the nurse. Methodology: Exploratory, descriptive bibliographic research carried out from February to June 2022 using the Virtual Health Library databases. 08 publications were selected, considering articles on the subject, available in full, in Portuguese and published between 2017 and 2022. Results: The risks and benefits of using the PICC in the UTIN and the role of the Nurse in the use of the PICC were highlighted. PICC in the UTIN, such as Decision Making, Driving, Monitoring. Intervention. Reduction of injuries and risk management. Conclusion: Nursing care regarding the usefulness, benefits, and risk of using the PICC must be conditioned to the recognition of the typical patient profile, predisposing vulnerabilities, and intrinsic risk factors, taking interventions capable of qualifying nursing care, promoting the reduction of pain and discomfort and the humanization of the procedure.

KEYWORDS: PICC, UTIN, neonatal, nursing

Os cuidados para o sofrimento psíquico do enfermeiro da unidade hospitalar

Care for the psychic suffering of the hospital unit nurse

Silva, Daiana Nunes da^a, Jesus, Daniela Ribeiro de^a, Silva, Everaldo Santos da^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

A depressão pode ser apresentada como um dos problemas psicológicos que mais atingem profissionais da saúde e diversas pessoas no mundo. Objetivo: Identificar, por meio da revisão bibliográfica, os cuidados para o sofrimento psíquico do enfermeiro da unidade hospitalar. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2017 e 2022. Para seleção dos textos foi realizada uma busca online nas Base de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde e *Google Acadêmico*. Consideraram-se 09 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Os cuidados para o sofrimento psíquico do enfermeiro da unidade hospitalar envolvem: bom ambiente de trabalho, qualidade de vida, acompanhamento psicológico e estabilidade no trabalho. Conclusão: O enfermeiro passa por longos períodos de trabalho sem descanso e sem apoio emocional e acompanhamento psicológico adequado e, ao se deparar com sofrimento psíquico, muitas vezes não consegue apoio na sua instituição de trabalho, sendo necessário recorrer aos Centro de Atenção Psicossocial para receber tratamento.

PALAVRAS-CHAVE: saúde mental, estresse na enfermagem, enfermeiro, unidade hospitalar, atenção primária em saúde

ABSTRACT

Depression can be presented as one of the psychological problems that most affect health professionals and many people in the world. Objective: To identify, through a literature review, the care for the psychic suffering of nurses in the hospital unit. Methodology: This is a descriptive literature review, built from materials published between 2017 and 2022. To select the texts, an online search was carried out in the Virtual Health Library Database and Google Scholar. We considered 09 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: The care for the mental suffering of nurses in the hospital unit involves good work environment, quality of life, psychological support, and job stability. Conclusion: Nurses go through long periods of work without rest and without emotional support and adequate psychological support and, when faced with psychological distress, they often cannot get support in their work institution, making it necessary to resort to the Psychosocial Care Center to receive treatment.

KEYWORDS: mental health, stress in nursing, nurse, hospital unit, primary health care

Enfermagem em cuidados intensivos a pacientes com COVID 19

Intensive care nursing for patients with COVID 19

Portela, Veronica dos Santos Silva^a, Ferreira, Janifer Aparecida Serapiao^a, Santos, Aryana Priscila dos^a, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

As Unidades de Terapia Intensiva (UTI) se constituíram em cenários de destaque na pandemia de 2020, considerando a necessidade de suporte tecnológico e de cuidados avançados aos pacientes com COVID-19, pois pouco se sabia sobre o coronavírus. Não havia conhecimento de cura e de tratamentos adequados, o que sobrecarregou os leitos de UTI e os profissionais da enfermagem necessitando reorganizar e atualizar os cuidados das unidades de terapia intensiva a pacientes com COVID-19. Objetivo: Identificar as atualizações dos cuidados intensivos de enfermagem a pacientes com COVID-19. Metodologia: Pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2015 e 2020. Para seleção dos textos foi realizada uma busca online nas Base de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Consideraram-se 3 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Na resposta sobre as atualizações dos cuidados intensivos de enfermagem a pacientes com COVID-19, evidenciou: A necessidade de analisar a gravidade da pandemia de COVID-19, refletir sobre a multidimensionalidade de ações necessárias para prevenção e controle da pandemia do novo coronavírus e, seguir as medidas de prevenção preconizadas pela Organização Mundial de Saúde para a abordagem do COVID-19. Conclusão: A gravidade do paciente com COVID-19 influenciou o aumento da intensidade do cuidado, do cuidar e das competências dos enfermeiros. Foram necessárias a criação e as adaptações de protocolos assistenciais no âmbito da UTI baseados em recomendações internacionais, além de ampliação dos conhecimentos para o atendimento às pessoas acometidas pelo novo coronavírus.

PALAVRAS-CHAVE: unidades de terapia intensiva, infecções por coronavírus, cuidados de enfermagem, cuidados críticos, enfermagem

ABSTRACT

Intensive Care Units (ICU) were prominent scenarios in the 2020 pandemic, considering the need for technological support and advanced care for patients with COVID-19, as little was known about the coronavirus. There was no knowledge of cure and adequate treatments, which overloaded ICU beds and nursing professionals needing to reorganize and update the care of intensive care units for patients with COVID-19. Objective: To identify intensive nursing care updates for patients with COVID-19. Methodology: A descriptive, bibliographic review research, built from materials published between 2015 and 2020. To select the texts, an online search was carried out in the Virtual Health Library Database. We considered 3 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: In response to updates on intensive nursing care for patients with COVID-19, it was highlighted: The need to analyze the severity of the COVID-19 pandemic, reflect on the multidimensionality of actions necessary to prevent and control the new coronavirus pandemic and, follow the prevention measures recommended by the World Health Organization for the approach of COVID-19. Conclusion: The severity of the patient with COVID-19 influenced the increase in the intensity of care, care, and nurses' skills. It was necessary to create and adapt care protocols within the ICU based on international recommendations, in addition to expanding knowledge for the care of people affected by the new coronavirus.

KEYWORDS: intensive care units, coronavirus infections, nursing care, critical care, nursing

Aptidão do enfermeiro na assistência de enfermagem a pessoas transexuais nos serviços de saúde

Aptitude of nurses in nursing care for transgender people in health services

Santos, Karla Pereira dos^a, Santos, Kethlen Pereira dos^a, Alves, Victor Emanuel Santos^a, Boyamian, Thais Morengue Di Lello^b, Pinho, Maria Carla Vieira^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

RESUMO

A população transsexual é um grupo diversificado, cuja identidade de gênero, se diferem em graus e expressões diversas do seu gênero designado ao nascer. Esta população enfrenta muitas dificuldades nos serviços de saúde, devido a discriminação, fazendo com que convivam com momentos de trans-travestifobia. Assim, questionamos: o enfermeiro possui conhecimento adequado para acolher as pessoas transexuais nos serviços de saúde? Objetivo: Identificar o conhecimento do enfermeiro sobre a assistência de enfermagem a pessoas transexuais nos serviços de saúde. Metodologia: Pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2016 e 2021. Realizou-se uma busca *online* nas Base de Dados da Biblioteca Virtual em Saúde e *Google acadêmico*. Consideraram-se 10 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Após análise dos artigos presente no estudo evidenciou-se que há uma falta de conhecimento do enfermeiro para a realização de um atendimento de qualidade as pessoas trans, além da desinformação sobre as políticas públicas voltadas às comunidades trans. Sabendo da grande relevância da atuação do enfermeiro no acolhimento e assistência nas redes de atenção em saúde, tais profissionais devem estar aptos e capacitados para garantir acesso das pessoas trans. Conclusão: Embora o enfermeiro exerça um grande papel na gestão do cuidado e serviço em saúde, percebe-se uma falta de conhecimento em volta da assistência das pessoas transexuais, criando prejuízos na elaboração e aplicação da sistematização em enfermagem, além das dificuldades nos outros aspectos com relação ao cliente e o enfermeiro.

PALAVRAS-CHAVE: transsexual, acolhimento, enfermagem, conhecimento

ABSTRACT

The transsexual population is a diverse group whose gender identity differs to varying degrees and expressions from their assigned gender at birth. This population faces many difficulties in the health services, due to discrimination, causing them to live with moments of trans-travestiphobia. Thus, we ask: do nurses have adequate knowledge to welcome transgender people in health services? Objective: To identify nurses' knowledge about nursing care for transgender people in health services. Methodology: A descriptive, bibliographic review, built from materials published between 2016 and 2021. An online search was carried out in the Virtual Health Library Database and Academic Google. We considered 10 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: After analyzing the articles present in the study, it became evident that there is a lack of knowledge on the part of nurses to provide quality care to trans people, in addition to misinformation about public policies aimed at trans communities. Knowing the great importance of the nurse's role in welcoming and assisting in health care networks, such professionals must be able and qualified to guarantee access for trans people. Conclusion: Although nurses play a great role in the management of care and health services, there is a lack of knowledge around the care of transsexual people, creating losses in the elaboration and application of systematization in nursing, in addition to difficulties in other aspects. in relation to the client and the nurse.

KEYWORDS: transsexual, reception, nursing, knowledge