

ENFERMAGEM

A importância e as estratégias para vacinação de crianças até 15 meses de vida

The importance and strategies for vaccinating children up to 15 months of age

Aisse Ribeiro de Oliveira Moreira^a; Beatriz Santana de Oliveira Assis^a; Mariana Gomes dos Santos^a; Romulo Melo de Carvalho^a; Ana Paula de Figueiredo^b

a Graduando (a) do curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU
b Docente do curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

Resumo

A vacinação é fundamental para todos os indivíduos, especialmente para crianças até os 15 meses de vida, visto que visam imunizar a crianças de vírus, bactérias e doenças que a criança ainda não teve contato e, quando este ocorrer, seu sistema imunológico estará protegido. Além disso, o aumento dos movimentos antivacina é um problema que precisa ser combatido. Objetivo: Identificar, por meio de uma revisão de literatura, a importância da vacinação e quais são as melhores estratégias para uma vacinação eficaz para crianças de até 15 meses de vida. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica realizada com artigos publicados entre 2018 e 2023. Para seleção dos textos foi realizada uma busca *online* nas Base de Dados da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). Consideraram-se 16 publicações que atenderam a temática do estudo, no idioma português, publicados de maneira integral. Resultados: Para apresentação dos resultados sobre a importância da vacinação e as estratégias necessárias para a vacinação de crianças até os 15 meses de vida, utilizou-se 03 categorias temáticas, sendo: (1) A importância da vacinação; (2) Vacinação de crianças até os 15 meses de vida; (3) Estratégias para vacinação. Considerações finais: A imunização é fundamental para que as crianças se desenvolvam de maneira saudável e para que as taxas de mortalidade diminuam. Doenças que já estavam erradicadas voltaram a surgir no Brasil, como é o caso da poliomielite, conhecida como paralisia infantil. O Brasil possui diversas estratégias e programas para incentivar a população a se vacinar, contudo, não está sendo o suficiente pois as taxas de vacinação passaram a cair nos últimos anos.

Descritores: esquema de imunização, vacinação da criança, cobertura vacinal

Abstract

Vaccination is fundamental for all individuals, especially for children up to 15 months of age, since it aims to immunize children from viruses, bacteria, and diseases that the child has not yet had contact with and, when this occurs, its immune system will be protected. In addition, the increase in anti-vaccine movements is a problem that needs to be combated. Objective: To identify, through a literature review, the importance of vaccination and the best strategies for effective vaccination for children up to 15 months of age. Methodology: This is a literature review research carried out with articles published between 2018 and 2023. To select the texts, an online search was conducted in the Databases of the VHL (Virtual Health Library). We considered 16 publications that met the theme of the study, in Portuguese, published in full. Results: To present the results about the importance of vaccination and the strategies needed to vaccinate children up to 15 months of age, we used 3 thematic categories: (1) The importance of vaccination; (2) Vaccination of children up to 15 months of age; (3) Strategies for vaccination. Final considerations: Immunization is essential for children to develop healthily and for mortality rates to decrease. Diseases that had been eradicated have reappeared in Brazil, such as polio, known as infantile paralysis. Brazil has several strategies and programs to encourage the population to get vaccinated, however, it is not being enough because vaccination rates have dropped in recent years.

Descriptors: immunization Schedule, childhood vaccination, vaccine coverage

O papel do enfermeiro na doação de órgãos no paciente de morte encefálica

The nurse's role in organ donation in the brain-dead patient

Araújo, Amanda Pereira Rosa Lourenço de, Valente, Bárbara Kelly da Silva^a; Siqueira, Bianca Domingues^a; Santos, Diego Reis dos^a; Roque, Júlio César Corrêa^a; Silva, Leandro Pereira de^a; Figueiredo, Ana Paula de^b

a Graduando (a) do curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU
b Docente do curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

Resumo

A doação de órgãos e tecidos é realizada quando o paciente vem a óbito, inclusive por meio de morte encefálica. O diagnóstico da morte encefálica deve ser realizado por meio de dois exames clínicos, com atenção e meticulosidade. No caso da morte confirmada, os cuidados de enfermagem são essenciais para que a doação ocorra de maneira eficaz. Objetivo: Identificar, por meio de uma revisão narrativa da literatura, como é realizada e o grau da eficácia da assistência do Enfermeiro na doação de órgãos em pacientes de morte encefálica. Metodologia: Pesquisa de revisão da literatura, realizada nas principais bases científicas da Biblioteca Virtual de Enfermagem (BVS), a partir de 2018, selecionando 18 artigos para o estudo. Resultados: Para apresentação dos resultados sobre os cuidados de enfermagem na doação de órgãos ao paciente em morte encefálica utilizou-se 03 categorias temáticas, sendo: (1) Cuidados de Enfermagem na doação de órgãos; (2) Morte Encefálica e os cuidados necessários; (3) Perspectiva Bioética da doação de Órgãos. Considerações finais: Os cuidados do enfermeiro ao paciente em morte encefálica são fundamentais para que a maior quantidade possível de órgãos seja doada. Além disso, é imprescindível que haja o respeito às vontades da família e à legislação vigente para que não haja desistência no meio do processo. Por fim, constatou-se que um dos pontos primordiais dos cuidados de enfermagem é a humanização do paciente e as estratégias adotadas para a manutenção do corpo e para a aceitação dos familiares.

Descritores: cuidados de enfermagem, morte encefálica, bioética

Abstract

Organ and tissue donation is performed when the patient dies, including brain death. The diagnosis of brain death should be made through two clinical examinations, with attention and meticulousness. In the case of confirmed death, nursing care is essential for the donation to occur effectively. Objective: To identify, through a narrative review of the literature, how is performed and the degree of effectiveness of nursing care in organ donation in brain-dead patients. Metodologia: Pesquisa de revisão da literatura, realizada nas principais bases científicas da Biblioteca Virtual de Enfermagem (BVS), a partir de 2018, selecionando 18 artigos para o estudo. Results: To present the results about the nursing care in organ donation to the brain-dead patient, we used 03 thematic categories: (1) Nursing care in organ donation; (2) Brain death and the necessary care; (3) Bioethical perspective of organ donation. Final Considerations: The nursing care to the brain death patient is fundamental to donate as many organs as possible. In addition, it is essential to respect the family's wishes and the legislation in force to avoid giving up in the middle of the process. Finally, it was found that one of the main points of nursing care is the humanization of the patient and the strategies adopted for the maintenance of the body and the acceptance of family members.

Descriptors: nursing care, brain death, Bioethics

Os desafios da enfermagem frente ao declínio da cobertura vacinal

The challenges of nursing in the face of declining vaccination coverage

Abileni França de Carvalho; Ágata Aline da Silva; Ágata Menezes da Silva; Aparecida Bernarda de Sousa Pereira; Guilherme Santiago dos Santos; Michael Douglas da Conceição

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

Resumo

O Programa Nacional de imunização (PNI), criado em 1973, é responsável pela organização da Política Nacional de Vacinação, a qual tem como missão o controle, da erradicação, e a eliminação de doenças imunopreveníveis. A política fortaleceu os municípios por meio da descentralização da gestão dos serviços e ações em saúde em relação à imunização, de maneira que a Atenção Primária de Saúde (APS) tornou-se responsável por todo o processo de administração dessas atividades. Objetivo: Identificar por meio do artigo científico, os desafios da enfermagem frente ao declínio à cobertura vacinal. Metodologia: Refere-se de uma pesquisa de embasamento teórico construída a partir de materiais publicados entre 2018 e 2023. Para apuração dos textos foi realizada uma busca online nas bibliotecas Scielo e base de dados EBSCO. Menciona-se 12 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. As palavras-chave investigadas foram: Enfermagem; Dificuldades; Cobertura vacinal. Resultado e discussão: Desse modo, após análise do artigo científico em questão, percebe-se que a enfermagem vem enfrentando grandes desafios no que se refere à cobertura vacinal. Considerações gerais: É primordial investir em campanhas de conscientização e capacitação da equipe de saúde para combater o declínio vacinal; é essencial que os profissionais de enfermagem sejam capacitados e estejam atualizados sobre as vacinas e seus benefícios para a saúde pública.

Descritores: enfermagem, dificuldades, cobertura vacinal, absenteísmo

Abstract

The National Immunization Program (PNI), created in 1973, is responsible for the organization of the National Vaccination Policy, which has as its mission the control, eradication, and elimination of immunopreventable diseases. The policy strengthened the municipalities by decentralizing the management of health services and actions in relation to immunization, so that Primary Health Care (PHC) became responsible for the whole process of administering these activities. Objective: To identify, through a scientific article, the challenges faced by nursing in the face of declining vaccination coverage. Methodology: This is a theoretical research based on materials published between 2018 and 2023. To determine the texts, an online search was conducted in Scielo and EBSCO databases. It is mentioned 12 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. The keywords investigated were: Nursing; Difficulties; Vaccination coverage. Results and discussion: Thus, after analyzing the scientific article in question, it is clear that nursing has been facing major challenges in terms of vaccination coverage. General considerations: It is essential to invest in awareness campaigns and training of the health team to combat vaccine decline; it is essential that nursing professionals are trained and updated on vaccines and their benefits to public health.

Descriptors: nursing, difficulties, vaccination coverage, absenteeism

A educação da gestante para os métodos não farmacológicos para alívio da dor do parto no pré-natal: revisão integrativa da literatura

Education of pregnant women on non-pharmacological methods for pain relief during labor in prenatal care: an integrative literature review

Silva, Camila Marcolino Pereira da^a, Silva, Daiane Sousa da^a, Oliveira, Elisângela Nascimento de^a, Nunes, Rebeca Valentim^a, Mendes, Tatiana Silva^a, Jesus, Yasmin Mendes de^a, Figueiredo, Ana Paula^b

a. Graduanda do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

Resumo

A pesquisa aborda a falta de ensino sobre métodos não farmacológicos de alívio da dor durante o parto, apesar de seus benefícios comprovados, visando uma abordagem humanizada. Identificar, por meio da revisão integrativa da literatura, os motivos pelo qual a educação das gestantes para os métodos não farmacológicos para alívio da dor do parto no pré-natal não é propriamente perpetuada pelos profissionais. Trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa da literatura, construída a partir de materiais publicados entre 2002 e 2021. Para seleção dos textos foi realizada uma busca online nas Bases de Dados da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). Consideraram-se 4 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português, espanhol e inglês. As palavras-chave investigadas foram: dor no parto; educação pré-natal; analgesia; terapias complementares. As práticas não farmacológicas no parto buscam superar modelo médico-centrado, enfatizando papel do enfermeiro obstetra em cuidados humanizados e métodos para alívio da dor. A educação pré-natal sobre métodos não farmacológicos no parto reduz medo e ansiedade, beneficiando gestante, companheiro e familiares.

Descritores: dor no parto, educação pré-natal, terapias complementares

Abstract

The research addresses the lack of teaching about non-pharmacological methods of pain relief during childbirth, despite its proven benefits, aiming at a humanized approach. To identify, through an integrative literature review, the reasons why the education of pregnant women about non-pharmacological methods for relieving labor pain during prenatal care is not properly perpetuated by professionals. This is a bibliographic review research, built with articles published between 2002 and 2021. To select the texts, an online search was carried out in the BVS Databases (Biblioteca Virtual em Saúde). We considered 4 publications that met the theme of the study, with full texts available, in Portuguese, Spanish and English. The keywords investigated were: labor pain; prenatal education; analgesia; complementary therapies. Non-pharmacological practices in childbirth seek to overcome the medical-centered model, emphasizing the role of obstetric nurses in humanized care and methods for pain relief. Prenatal education on nonpharmacological methods in childbirth reduces fear and anxiety, benefiting pregnant women, partners, and family members.

Descriptors: labor pain, prenatal education, complementary therapies

O papel do Enfermeiro no SUS no cuidado a mulheres vítimas de violência sexual

The role of the SUS nurse in the care of women victims of sexual violence

Ana Paula Frade Perrenoud^a; Ana Paula Lima Gomes da Silva^a; Beatriz Ferreira de Castro^a; Débora Ferreira Guiné^a; Tais Vieira dos Santos^a; Ana Paula de Figueiredo^b

^a Graduanda do curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU
^b Docente do curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

Resumo

A violência contra a mulher, principalmente de natureza sexual, é uma problemática que atinge todo o mundo, precisando de intervenção. Para isso, é fundamental que os enfermeiros e toda a equipe de enfermagem estejam capacitados para lidar com as mulheres que foram vítimas de tal violência. Objetivo: Identificar, por meio da revisão bibliográfica, os cuidados do Enfermeiro no SUS à mulher vítima de violência sexual. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2018 e 2023. Para seleção dos textos foi realizada uma busca *online* nas Base de Dados da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). Consideraram-se 25 publicações que atenderam a temática do estudo, no idioma português e que foram publicados de maneira integral. Resultados: Para apresentação dos resultados sobre os cuidados do Enfermeiro do SUS à mulher vítima de violência sexual utilizou-se 04 categorias temáticas, sendo: (1) Atuação do Enfermeiro no SUS; (2) A importância da Atenção Primária à Saúde na saúde da mulher; (3) Iniciativas do SUS à mulher vítima de violência; (4) Cuidados de Enfermagem à mulher vítima de violência sexual. Considerações finais: O enfermeiro atuante no SUS possui um papel essencial na promoção da saúde e no atendimento às mulheres vítimas de violência sexual, realizando seu acolhimento na Atenção Primária à Saúde, de maneira humanizada e integralizada. Além disso, o enfermeiro deve atuar para que a mulher, vítima, se sinta segura para receber o tratamento adequado.

Descritores: violência contra a mulher, violência sexual, papel do profissional de enfermagem

Abstract

Violence against women, especially sexual violence, is a problem that affects the whole world, requiring intervention. For this, it is fundamental that the nurses and all the nursing team are qualified to deal with women who were victims of such violence. Objective: To identify, through literature review, the care provided by nurses in the SUS to women who are victims of sexual violence. Methodology: This is a literature review research, descriptive, built from materials published between 2018 and 2023. For the selection of texts, an online search was conducted in the Databases of the VHL (Virtual Health Library). We considered 25 publications that met the theme of the study, in Portuguese language and that were published in full. Results: To present the results about the care provided by SUS nurses to women victims of sexual violence, four thematic categories were used: (1) Practice of nurses in SUS; (2) The importance of primary health care in women's health; (3) SUS initiatives to women victims of violence; (4) Nursing care provided to women victims of sexual violence. Final considerations: The nurse working in SUS has an essential role in health promotion and care to women victims of sexual violence, performing their reception in Primary Health Care, in a humanized and integral way. In addition, the nurse must act so that the woman victim feels safe to receive the appropriate treatment.

Descriptors: violence against women, sexual violence, role of the nursing professional

Os impactos da idealização da maternidade na saúde mental da mulher em seu período gravídico-puerpério

The impacts of the idealization of maternity on women's mental health in their pregnancy-puerperium period

Ferreira, Ana Beatriz de Oliveira^a, Nascimento, Beatriz Campos^a, Santos, Larissa Silva dos^a, Teixeira, Maria Rita Albuquerque^a, Weiss, Shayane Correia^a, Santos, Stefany Aguiar^{a,b}, Figueiredo, Ana Paula de

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU
b. Docente do Curso de Graduação de Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU

Resumo

A maternidade romantizada ocasionada pela idealização da sociedade sobre o período gravídico-puerpério na vida da mulher, além da cobrança veiculadas a esse momento, tendo como consequência impactos na saúde mental, como: transtornos psiquiátricos e psicológicos, além de gerar sentimentos de opressão, sofrimento, impotência. Objetivo: Analisar, por meio da revisão bibliográfica, o papel da sociedade e a importância dele na maternidade da mulher, dar assistência psicológica; a equipe de enfermagem auxilia, orienta e participa do cuidado das gestantes em seu período gestacional e puerpério. Portanto, essa pesquisa trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2018 e 2023. Metodologia: Para seleção dos textos foi realizada uma busca online nas Base de Dados da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e Scielo (Scientific Electronic Library Online). Consideraram-se 16 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. Resultados: Para apresentação sobre os impactos da idealização da maternidade na saúde mental da mulher em seu período gravídico-puerpério, utilizou-se 02 categorias temáticas, sendo: (1) Maternidade e (2) Saúde Mental. Considerações finais: Os impactos da romantização da maternidade na vida da mulher são diversos, é muito importante o trabalho do psicólogo e da equipe de enfermagem que irão orientar e dar assistência as futuras mães em seu período gravídico-puerpério; além da equipe de enfermagem romper essa idealização.

Descritores: romantização da maternidade, impacto na vida da mulher, apoio psicossocial

Abstract

Romanticized motherhood caused by society's idealization of the pregnancy-puerperium period in women's lives, in addition to the demands conveyed at that moment, resulting in impacts on mental health, such as: psychiatric and psychological disorders, in addition to generating feelings of oppression, suffering, impotence. Objective: To analyze, through literature review, the role of society and its importance in the woman's maternity, give psychological assistance; the nursing team assists, guides and participates in the care of pregnant women in their gestational period and puerperium. Therefore, this research is a literature review, descriptive, built from materials published between 2018 and 2023. Methodology: To select the texts, an online search was conducted in the VHL (Virtual Health Library) and Scielo (Scientific Electronic Library Online) databases. We considered 16 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. Results: To present the impacts of the idealization of motherhood on the mental health of women in their pregnancy-puerperium period, two thematic categories were used: (1) Maternity and (2) Mental Health. Final considerations: The impacts of the romanticization of maternity in women's lives are diverse, it is very important the work of the psychologist and the nursing team that will guide and assist future mothers in their pregnancy-puerperium period; besides the nursing team to break this idealization.

Descriptors: romanticization of motherhood, impact on women's lives, psychosocial support

Atuação do enfermeiro ao paciente oncológico com câncer de mama gestacional

Nurse performance to the oncological patient with gestational breast cancer

Santos, Eduarda Mendonça dos^a, Alves, Erika Oliveira^a, Silva, Grazielle Mariane de Aquino Alves da^a, Silva, Maria Aparecida dos Santos^a, Soares, Mayara dos Santos^a Silva, Wallace^a, Figueiredo, Ana Paula de^b

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

Resumo

O câncer de mama associado à gravidez é definido como aquele diagnosticado durante a gestação, a lactação ou no primeiro ano após o parto. Identificar, por meio da revisão bibliográfica, os cuidados de enfermagem para a gestante portadora de câncer de mama. Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2013 e 2022. Para seleção dos textos foi realizada uma busca *online* na Base de Dados da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). Consideraram-se 10 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. As palavras-chave investigadas foram: câncer, gestação e câncer de mama. A pesquisa eletrônica se deu no período de fevereiro a maio de 2023. Para apresentação dos resultados sobre os cuidados de enfermagem com a mulher em período gravídico portando câncer de mama utilizou-se 04 categorias temáticas, sendo: (1) Sistematização da assistência de Enfermagem; (2) Apoio emocional para a gestante, parceiro(a) e família; (3) Preparo profissional para a situação específica e; (4) Cuidado individualizado. Ao implementar a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) o enfermeiro traz um trabalho humanizado e individual, com enfoque na gestante, no feto e na família, dando um total apoio emocional, disposto e pronto para sanar todas e quaisquer dúvidas que surgirem ao longo do diagnóstico e tratamento.

Descritores: câncer, gestação, enfermagem

Abstract

Pregnancy-associated breast cancer is defined as cancer diagnosed during pregnancy, lactation or in the first year after childbirth. To identify, through a bibliographic review, nursing care for pregnant women with breast cancer. This is a bibliographic review, descriptive research, built from materials published between 2013 and 2022. To select the texts, an online search was carried out in the VHL Database (Virtual Health Library). 10 publications that met the subject of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. The keywords investigated were: cancer, pregnancy and breast cancer. The electronic survey took place from February to May 2023. To present the results on nursing care for women in the pregnancy period with breast cancer, 04 thematic categories were used, namely: (1) Systematization of care of nursing; (2) Emotional support for the pregnant woman, partner and family; (3) Professional preparation for the specific situation and; (4) Individualized care. When implementing the Systematization of Nursing Care (SAE), the nurse brings a humanized and individual work, focusing on the pregnant woman, the fetus and the family, giving total emotional support, willing and ready to solve any and all doubts that may arise during diagnosis and treatment.

Descriptors: cancer, pregnancy, nursing

Condutas de enfermagem frente ao comportamento suicida

Nursing behaviors in front of suicidal behavior

Albuquerque, Aline Baim De Santana^a, Luz, Ana Paula Alves da^a, Fetter, Vanessa Máximo Soares^a, Rocha, Suzelia de Souza^a, Silva, Romário Gomes da^a, Figueiredo, Ana Paula de^b

a. Graduando do curso em enfermagem do centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU

Resumo

Os profissionais de enfermagem são importantes provedores de tratamento e cuidados, envolvidos majoritariamente na assistência em todo o processo de saúde e saúde mental. O comportamento suicida, representa um desafio aos profissionais de enfermagem que objetivam o suprimento das necessidades do paciente de maneira humanizada. A escuta, aparece como recurso terapêutico da equipe enfermagem no acolhimento do paciente, também, é comum a associação do comportamento suicida ao sofrimento mental. Contudo, as condutas da equipe de enfermagem na identificação do comportamento suicida aparecem, por vezes, empíricas, permeadas de estigmas sociais e julgamentos, o que retrata certo despreparo da equipe. Esse despreparo gera sentimentos de angústia, frustrações e medo. Objetivo: Identificar as condutas de enfermagem frente ao comportamento suicida nos diferentes níveis de atenção à saúde. Metodologia: Revisão da bibliografia, utilizando as bases de dados da BVS (Biblioteca Virtual da Saúde): Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e SciELO (*Scientific Electronic Library Online*), no idioma português e inglês, publicadas entre 2018 e 2023. Resultados: 08 estudos analisados, compreenderam 3 categorias, “categoria 1 – Saúde Mental e CAPS”, “categoria 2 – Cuidados e Diagnósticos de enfermagem”, “categoria 3 – Assistência de enfermagem”. Considerações finais: Evidenciou-se a lacuna do conhecimento dos profissionais de enfermagem, na identificação do comportamento suicida, e a necessidade de adoção de programas de educação continuada, que abordem a temática.

Descritores: enfermagem, saúde mental, transtorno mental

Abstract

Nursing professionals are important providers of treatment and care, mostly involved in care throughout the health and mental health process. Suicidal behavior represents a challenge to nursing professionals who aim to meet the patient's needs in a humanized way. Listening appears as a therapeutic resource for the nursing team in welcoming the patient. It is also common to associate suicidal behavior with mental suffering. However, the conduct of the nursing team in identifying suicidal behavior sometimes appears empirical, permeated with social stigmas and judgments, which portrays a certain lack of preparation on the part of the team. This unpreparedness generates feelings of anguish, frustration and fear. Objective: To identify nursing behaviors towards suicidal behavior at different levels of health care. Methodology: Literature review, using the VHL (Virtual Health Library) databases: Lilacs (Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences) and SciELO (Scientific Electronic Library Online), in Portuguese and English, published between 2018 and 2023. Results: 08 studies analyzed, comprised 3 categories, "category 1 - Mental Health and CAPS", "category 2 - Nursing Care and Diagnoses", "category 3 - Nursing Assistance". Final considerations: The lack of knowledge of nursing professionals in identifying suicidal behavior was evidenced, as well as the need to adopt continuing education programs that address the issue.

Descriptors: nursing, mental health, mental disorder

Inclusão do paciente com deficiência auditiva na atenção primária e suas interfaces no cuidado de Enfermagem

Inclusion of patients with hearing disabilities in primary care and yours interfaces in nursing care

Pereira, Ana Carolina de Souza; Junior, Carlos Eduardo Teixeira; Souza, Ithalo Felipe Nascimento de; Teixeira, Jacqueline da Silva; Araújo, Millons Matheus Cardoso de; Silva, William Kennedy Gomes da

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU
b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU

Resumo

O atendimento inclusivo é pouco explorado e isso gera falta de comunicação efetiva na sociedade, criando limitações sociais dentro da assistência à saúde, principalmente quando tratamos do contato direto com deficientes auditivos e surdos. Objetivo: Identificar, por meio de revisão bibliográfica eletrônica a inclusão dos pacientes com deficiência auditiva e a assistência de enfermagem na atenção primária. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica de artigos científicos, teses, dissertações e livros publicados nos últimos dez anos, abordando os temas relacionados à saúde auditiva, a acessibilidade e a inclusão dos pacientes com deficiência auditiva no contexto da atenção primária à saúde. Esta pesquisa bibliográfica descritiva utilizou artigos e obras online para investigar a assistência de enfermagem à pessoa deficiente auditiva e/ou surda. Foram estabelecidos critérios de inclusão e exclusão, seguidos por análise e interpretação dos estudos selecionados. A apresentação dos resultados ocorreu de forma descritiva, visando fornecer uma revisão organizada das evidências sobre o tema. Os resultados apontam que o acesso aos serviços de saúde por pacientes com deficiência auditiva ainda é limitado, e que as barreiras de comunicação são um dos principais obstáculos para a inclusão desses pacientes no sistema de saúde. Os estudos destacam a importância do uso de tecnologias assistivas, como intérpretes de Libras, para garantir a comunicação efetiva entre o paciente e o profissional de saúde. Em síntese, este trabalho reforça a necessidade de políticas públicas que promovam a acessibilidade e a inclusão de pacientes com deficiência auditiva na atenção primária à saúde, com a utilização de tecnologias assistivas e a capacitação dos profissionais de saúde para atender esses pacientes de forma efetiva e humanizada.

Descritores: surdez, atendimento inclusivo, consulta de enfermagem

Abstract

Inclusive care is little explored, and this generates a lack of effective communication in society, creating social limitations within health care, especially when dealing with direct contact with the hearing impaired and the deaf. Objective: To identify, through an electronic bibliographic review, the inclusion of patients with hearing impairment and nursing care in primary care. For this, a bibliographic review of scientific articles, theses, dissertations and books published in the last ten years was carried out, addressing themes related to hearing health, accessibility and inclusion of patients with hearing impairment in the context of primary health care. This descriptive bibliographic research used articles and online works to investigate nursing care for the hearing impaired and/or deaf person. There were inclusion and exclusion criteria, followed by analysis and interpretation of the selected studies. The presentation of the results occurred in a descriptive way, aiming to provide an organized review of the evidence on the subject. The results indicate that access to health services by patients with hearing impairment is still limited, and that communication barriers are one of the main obstacles to the inclusion of these patients in the health system. Studies highlight the importance of using assistive technologies, such as Libras interpreters, to ensure effective communication between the patient and the health professional. In summary, this work reinforces the need for public policies that promote accessibility and inclusion of patients with hearing impairment in primary health care, with the use of assistive technologies and the training of health professionals to care for these patients effective and humane way.

Descriptors: deafness, inclusive care, nursing consultation

Desafios da hipertensão gestacional e o risco para desenvolvimento de pré-eclâmpsia

Challenges of gestational hypertension and the risk for developing pre-eclampsia

Souza, Daniel Aquino Sena. Lima, Jenifer Gomes. Barboza, Jéssica Vitória dos Santos. Araújo, Julia Dias dos Santos. Santos, Nayara Oliveira Leal. Oliveira, Larissa Beatrice Silva.

a. Graduando do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas- FMU.

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas- FMU

Resumo

A hipertensão é uma doença crônica e quando se apresenta durante a gestação é necessário um cuidado especial, para que não desenvolva outras patologias, por este motivo é de extrema importância o pré-natal e acompanhamento assíduo com a equipe de saúde, mantendo-se informada sobre a evolução da gravidez e tratamentos, assim minimizando os riscos de complicações. A pré-eclâmpsia decorrente da hipertensão, ocorre após a 20ª semanas de gestação, acompanhada de proteinúria e se classifica como leve ou grave com desaparecimento dos sintomas até 12ª semana pós-parto. Objetivo: Identificar, por meio da revisão bibliográfica, os fatores de risco relacionados à hipertensão em gestantes e possíveis complicações. Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva e construída a partir de materiais publicados entre 2015 e 2019. Para seleção dos textos foi realizada uma busca online nas Base de Dados da BVS (Biblioteca Virtual da Saúde), como: Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e SciELO (Scientific Electronic Library Online). Consideraram-se 4 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português, espanhol e inglês. As palavras-chave investigadas foram: Gestação; Hipertensão; Pré-eclâmpsia. Evidenciou-se diante a literatura consultada, que entre todos os tipos de hipertensão presentes nas gestações, destaca-se a pré-eclâmpsia, pois está associada aos piores resultados das síndromes hipertensivas, podendo levar a interrupção prematura da gestação e sendo a principal causa de morte materna e perinatal, mostrando-nos a importância do conhecimento da doença, que mesmo sem esclarecimento exato de sua etiologia, apresenta sintomas característicos. Conclui-se que a hipertensão gestacional e o possível desenvolvimento de pré-eclâmpsia trazem diversos desafios para a gestante, como também para os profissionais de saúde presentes no cuidado.

Descritores: gestação, hipertensão, pré-eclâmpsia

Abstract

Hypertension is a chronic disease and when it occurs during pregnancy, special care is required so that it does not develop other pathologies, for this reason, prenatal care and assiduous follow-up with the health team are extremely important, maintaining it experienced on the evolution of pregnancy and treatments, thus minimizing the risks of complications. Pre-eclampsia resulting from hypertension, occurs after the 20th week of gestation, concomitant with proteinuria, and is classified as mild or severe with the disappearance of symptoms by the 12th week postpartum. Objective: To identify, through a bibliographical review, the risk factors related to hypertension in pregnant women and possible complications. This bibliographic review research is descriptive and built from materials published between 2015 and 2019. To select the texts, an online search was carried out in the VHL Database (Virtual Health Library), such as Lilacs (Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences) and SciELO (Scientific Electronic Library Online). We considered 4 publications that met the theme of the study, published in total, with full texts available, in Portuguese, Spanish, and English. The keywords investigated were: Pregnancy; Hypertension; Pre-eclampsia. It was evident from the consulted literature that, among all types of hypertension present in pregnancies, pre-eclampsia stands out, as it is associated with the worst results of hypertensive syndromes, which can lead to premature termination of pregnancy and childbirth the main cause of maternal and perinatal death, showing us the importance of knowing the disease, which even without an exact explanation of its etiology, symptoms have characteristics. It is concluded that gestational hypertension and the possible development of preeclampsia bring several challenges for the pregnant woman, as well as for the health professionals present in the care. **Descriptors:** pregnancy, hypertension, pre-eclampsia

A importância do enfermeiro na saúde do idoso portador de diabetes

The importance of the nurse in the health of elderly people with diabetes.

Santos, Adriana de Araújo^a, Santos, Camila Rodrigues^a
Santos, Cristina Pena dos^a, Monteiro, Gabriela Augusta^a
Carvalho, Keila Elias^a, Silva, Patrick Pedro Valério da^a, Figueiredo, Ana Paula de^b

a. Graduando do curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas- FMU.

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas- FMU.

Resumo

Atingindo cerca de 425 milhões de pessoas no mundo, a Diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome metabólica, que ocorre devido à destruição auto-imune de células beta pancreáticas. No Brasil, a diabetes mais prevalente é a tipo 2 com cerca de 95% dos casos, ocorrendo principalmente devido aos processos de envelhecimento, o idoso sofre significativamente em decorrência podendo levar a problemas que o impedem de conduzir atividades do dia a dia. O enfermeiro possui o papel primordial de evitar agravos, ensinar, tratar e detectar precocemente a patologia. Objetivo: identificar por meio da revisão bibliográfica a importância do enfermeiro na saúde do idoso portador de diabetes Mellitus. Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2018 a 2023. Para seleção dos textos foi realizada uma busca online da Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde, Base de Dados da Enfermagem; Medical Literature Analysis and Retrieval System Online por meio de consulta ao portal da Biblioteca Virtual em Saúde e Scientific Electronic Library. Consideraram-se 11 publicações que atenderam a temática do estudo, publicadas na íntegra, com textos completos disponíveis, no idioma português. As palavras-chave investigadas foram: Diabetes Mellitus; Idoso; Qualidade de vida. Para apresentação dos resultados sobre a importância do papel do enfermeiro na saúde do idoso portador de diabetes utilizou-se 03 categorias temáticas, sendo: (1) Diabetes Mellitus; (2) Fatores de Riscos; (03) A importância do enfermeiro. Conclui-se que além do cuidado biomédico, o grande desafio ainda está na utilização de tecnologias leves. O papel de educador do enfermeiro (a) é fundamental no processo de estabelecimento de vínculo de confiança e conscientização do idoso como usuário ativo e principal responsável por sua saúde. É preciso disponibilizar as melhores evidências para o cuidado ao idoso com diabetes na Atenção Primária.

Descritores: idoso portador de Diabete, papel do enfermeiro, cuidado com idoso

Abstract

Affecting about 425 million people worldwide, Diabetes Mellitus (DM) is a metabolic syndrome a million people worldwide, Diabetes Mellitus (DM) is a metabolic syndrome, which occurs due to the autoimmune destruction of pancreatic beta cells. In Brazil, the most prevalent type 2 with about 95% of the cases, occurring mainly due to the aging process, the elderly due to the aging processes, the elderly suffer significantly as a result and can lead to problems that prevent them from conducting their daily activities. Day to day activities. The nurse has the primary role of preventing, teaching, treating, and detecting early pathology. Pathology. Objective: to identify, through literature review, the importance of the nurse in the health of the elderly carrier of diabetes mellitus. This is a literature review research, descriptive, constructed from materials published between 2018 and 2023. For the selection of the to select the texts, an online search of the Latin American Literature in Health Sciences, Nursing Database, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online was conducted by consulting the portal of the Virtual Health Library and Scientific Electronic Library. We considered 11 publications that met the theme of the study, published in full, with full texts available, in Portuguese. The keywords investigated were: Diabetes Mellitus; Aged; Quality of life. To present the results about the importance of the nurse's role in the health of elderly people with diabetes, we used 03 thematic categories: (1) Diabetes Mellitus; (2) Risk Factors; (3) The importance of the nurse. We conclude that in addition to biomedical care, the great challenge still lies in the use of soft technologies. The nurse's role as an educator is fundamental in the process of establishing a bond of trust and awareness of the elderly as active users and the main responsible for their health. It is necessary to make available the best evidence for the care of the elderly with diabetes in Primary Care.

Descriptors: elderly with diabetes, role of nurses, elderly care

Transplante dominó hepático em crianças com leucínose

Domino liver transplantation in children with leucínose

Sobrinho, Alana Ribeiro^a, Naujalis, Fabiano Ferreira^a, Silva, Joyce da Oliveira^a, Fioravante, Marcela Vitória Lopes^a, Moraes, Marília Rafaelle Altino de^a, Gusmão, Michele Scavassa Mattos^a, Figueiredo, Ana Paula^b

a. Graduando do curso em enfermagem do centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

b. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU

Resumo

A Doença da urina de xarope de bordo (MSUD) tem sua incidência em crianças, visto que trata-se de um erro inato no metabolismo doença que é detectada na realização do teste do pezinho. Antes do ano de 2021 o teste do pezinho disponibilizado pelo SUS abrangia apenas 6 doenças raras o que dificultava o rápido diagnóstico e tratamento, porém em maio de 2021 foi sancionada a “Lei N° 14.154,” a partir de junho de 2021 o teste do pezinho passou a abranger mais de 50 doenças, o que tende a agilizar o diagnóstico. Possibilidades de tratamento está a utilização da “Nutrição Formulada MSUD” e transplante de fígado. Objetivo: Identificar por meio da revisão bibliográfica os riscos e benefícios do transplante dominó hepático em crianças com leucínose. Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, descritiva, construída a partir de materiais publicados entre 2018 e 2023. Para seleção dos textos foi realizada uma busca online nas bases de dados da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e Scielo (Scientific Electronic Library Online) MEDLINE e Online ScienceDirect, Pubmed. Considerando 13 publicações que atenderam a temática do estudo, publicados na íntegra com textos completos disponíveis no idioma português e inglês. Para apresentação dos resultados sobre transplante dominó hepático em crianças com leucínose. Utilizou-se de 2 categorias: (1) Triagem Neonatal – Nova Lei abrangência nacional pelo SUS; (2) Transplante de fígado como possibilidade de tratamento e a liberação da fila de transplante, riscos e benefícios. Conclui-se que o transplante dominó hepático é o recurso fundamental para tratamento e cura em pacientes com DXB, Ressaltamos a importância da enfermagem promover conhecimento sobre as possibilidades de transplante intervivo.

Descritores: transplante dominó hepático, doença da urina de xarope de bordo, erro inato metabolismo

Abstract

Maple Syrup Urine Disease (MSUD) has its incidence in children since it deals with an inborn error in metabolism being detected when performing the heel prick test. Leucínose is characterized by genetic alterations in metabolism and this is a hereditary disease generating several pathologies directly affecting the liver, breathing, respiratory functions, the first symptoms appear between 7 to 10 days of life. Due to the often late diagnosis due to lack of adequate tests carried out in neonatal screening that prove the disease more quickly, thus generating a poor prognosis and until there is a correct diagnosis, children develop many sequelae, before the year 2021 the heel prick test made available by the SUS covered only 6 rare diseases, which made rapid diagnosis and treatment difficult, but in May 2021 “Law No. which tends to speed up the diagnosis. Among the treatment possibilities is the use of “MSUD Formulated Nutrition” and liver transplantation, which can also be done by a living donor, but due to lack of information, the population is not aware of this intervention, which makes transplantation difficult. liver domino. Objective: To identify, through a literature review, the risks and benefits of domino liver transplantation in children with leucínose. Methodology: Bibliographic review, using the databases of (BVS) Virtual Health Library (LILAS) Latin American and Caribbean Health Sciences Literature (LILACS), MEDLINE, (SciELO) Scientific Electronic Library Online, Pubmed, ScienceDirect, in Portuguese and English, published between 2018 and 2023. Result: 14 studies analyzed, considering 4 categories, “Category 1 – Neonatal Screening – New Law and nationwide coverage by the SUS”, “2 – Inborn error of metabolism”, “3 – Liver transplantation as a possibility of treatment and release from the transplant queue”, “4 – Risks and benefits of the person transplanted” Final Considerations: It is concluded that the liver domino transplante is the best form of treatment and cure for patients with MSUD.

Descriptors: domino liver transplantation, maple syrup urine disease, inborn error metabolism